



ເລັກງນ້ອຍໆ ກຸ່ວກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ຂຽນໂດຍ ຄຳຟ້າ ຈັນທະວົງສາ

ແຕ້ມໂດຍ ກົງເງິນ ແສງດີ

Pha Tad Ke Botanical Garden - Luang Prabang

ເລັກງນ້ອຍໆ ກຸ່ມກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ຂຽນໂດຍ ຄຳຟ້າ ຈັນທະວົງສາ
ແຕ້ມໂດຍ ກົງເງິນ ແສງດີ

Khamfa Chanthavongsa
*Drawings by **Kongngern Sengdee***





ເລັກງນ້ອຍໆ ກຸ່ວກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ຄໍາທີ່ກ່າວເຖິງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໃຫ້ພາບແບບໜັກໜາ ໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ກວ້າງໄກແກ່ ພວກເຮົາເອົາແທ້ເອົາວ່າ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ສໍາພັດກັບສິ່ງ ເຫຼົ່ານີ້ເກືອບທຸກວັນບໍ່ວ່າໃນຮູບເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ, ອາຫານການກິນ, ຫວ້ານຢາທານັ່ງ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ... ຈົນເຮົາມອງຂ້າມ ບໍ່ເຫັນຄວາມສໍາຄັນພໍເທົ່າໃດເລີຍ. ຄວາມຈິງ ແລ້ວຄໍາສັບເປັນພາສາອັງກິດແມ່ນ Non Timber Forest Products ຫຼື Non woody Forest Products ແລະ ເປັນພາສາຝຣັ່ງແມ່ນ Les produits sous-forestiers ຫຼື Les produits non ligneux ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ, ຄວາມໝາຍໃນພາສາ ລາວ ກໍ່ແມ່ນທຸກສິ່ງທີ່ມີໃນປ່າທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ້ (ໄມ້ຖ່ອນ) ນັ້ນເອງ ຊຶ່ງ ໄດ້ແກ່: ພືດຜັກ, ໝາກໄມ້, ຢາພື້ນເມືອງ, ສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ, ... ແຕ່ ໃນນັ້ນພັດຍັງ ກວມເອົາໄມ້ພື້ນ ແລະ ຖານອີກ ນອກຈາກພວກຫວາຍ ທີ່ເພິ່ນນຳມາໃຊ້ ເປັນອາຫານ, ເຮັດຕັ້ງເຮັດຕູ້ ແລະ ເຄື່ອງຫັດຖະກຳຫຼາກຫຼາຍປະເພດ. ອີງຕາມວິທີທີ່ຜູ້ຄົນນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງມາ ແຕ່ບູຮານນະການມາເພິ່ນຈຶ່ງ ແບ່ງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງອອກເປັນ 7 ກຸ່ມໃຫຍ່ດັ່ງ: ເຄື່ອງ ປ່າຂອງດົງທີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານ, ໃຊ້ເປັນຢາ, ໃຊ້ເສັ້ນໄຍ, ໃຫ້ນ້ຳມັນ, ໃຊ້ປະດັບ ແລະ ຕົບແຕ່ງ, ໃຊ້ເຮັດຖານ ແລະ ພື້ນ ແລະ ກຸ່ມສຸດທ້າຍໄດ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ ຊຶ່ງແມ່ນ ບັນດາສັດປ່າທັງຫຼາຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ໄດ້ມາຈາກສັດດັ່ງ ງາຊ້າງ, ຂົນສັດ, ກະດູກ, ໜັງສັດ ດັ່ງນີ້ ເປັນຕົ້ນ.... ໃນທົ່ວປະເທດ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເຂົ້າໃນການດຳ ລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນລາວມີເຖິງ 80% ແລະ ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເກັບມາຂາຍໂດຍກົງ ຫຼື ແປຮູບເລັກນ້ອຍໃນປີ ໜຶ່ງໆກວມເອົາປະມານ 50% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ ແລະ ລາຍຮັບທັງໝົດທີ່ໄດ້ຈາກ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງລະດັບປະເທດ ແມ່ນ 20-30% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນແຫ່ງ ຊາດ (Joost Foppes ແລະ Sounthone Ketphanh, 2000). ໃນເມື່ອມີລາຍຮັບ ຍ້ອນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງສູງປານນັ້ນ ແນ່ນອນການຊ່ວງເສັງກັນເກັບກູ້ ແລະ ເກີນຂອບ ເຂດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຊະນິດຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ບາງຊະນິດມີທ່າອ່ຽງໄກ້ຈະສູນ ພັນເຊັ່ນ: ເຄືອແຫມ, ໝາກແຫນງ, ຢາງບົງ, ໄມ້ເກັດສະໜາ (ຂີ້ຊີໄມ້ເກດ), ຫົວກອຍ ແລະ ອື່ນໆ... ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ ໄດ້ຮວບຮວມເອົາ ສະເພາະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ເປັນພາກ ສ່ວນ ພືດເທົ່ານັ້ນມາສະເໜີ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກກັບລັກສະນະ ແລະ ນິເວດ ຂອງແຕ່ລະຊະນິດ, ການກະຈາຍພັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ ເພື່ອຈະເຫັນຊ່ອງທາງຊຸກຍູ້, ແກ້ໄຂ ຫຼື ສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ ຢ່າງມີການປະຢັດ ແລະ ຮັກສາພັນພືດເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຍືນຍົງ ຄົງ ຕົວໄວ້ໃຫ້ລຸ້ນລູກ ລຸ້ນຫຼານຂອງ ພວກເຮົາ ໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ມັນໄປອີກນານໆ.



ຮູບ 1: ຮູບດອກບານ

ຮູບ 2: ຮູບດອກຈຸມ

ຕົ້ນ ດອກແຄຂົນ [Ton Khae Khon]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Markhamia stipulata*

ຂ້ອຍແມ່ນຕົ້ນດອກແຄຂົນ ເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນ, ມີອາຍຸຫຼາຍປີ ແລະ ມີການກະຈາຍ ພັນຢູ່ປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ, ມຽນມາ, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ອິນເດຍ. ຂ້ອຍມັກເກີດຕາມປ່າໂຄກ, ປ່າປະສົມ ແລະ ປ່າດົງດິບອີກ. ລຳຕົ້ນຂອງ ຂ້ອຍ ສູງ 10-15 ມ, ເສັ້ນຜາກາງ 50-80 ຊມ, ເປືອກລຽບ ອອກສີເທົາແກມເຫຼືອງ. ໃບ ແມ່ນໃບປະສົມແບບຂົນນົກ ປາຍຄືກ, ຍາວ 23-25 ຊມ, ໃບຍ່ອຍມີຮູບຂອບ ຂະໜານແກມຮູບຫອກ, ປາຍໃບແຫຼມ, ກົກໃບມົນ, ກ້ານໃບຍ່ອຍ ຍາວ 1 ຫາ 4 ຊມ. ພິເສດ ໃບອ່ອນ ມີຂົນດົກໜາ ກວ່າສ່ວນອື່ນໆ ທັງໃບຍ່ອຍອ່ອນກໍ່ໂກບງເຂົ້າຫາກັນ ຕ່າງຈາກ ຊະນິດອື່ນໃນຕະກຸນດຽວກັນ. ດອກ ອອກເປັນຊໍ່ ຍາວ 4-5 ຊມ. ດອກຈຸມ ອອກສີແດງອົມມ້ວງແກມເຫຼືອງ, ເວລາບານ ຈຶ່ງອອກສີເຫຼືອງເຂັ້ມ ຫຼື ເຫຼືອງຈືດໆ. ກາບດອກ ມີ 5 ກາບ, ຕົ້ນກາບດອກ ເຊື່ອມຕິດກັນເປັນ ຫູອດ ຮູບກະດິ່ງ ແລະ ກົບ ດອກ ມີ 5 ກົບ ເຊື່ອມຕິດກັນເປັນຫູອດ ຮູບກະດິ່ງເຊັ່ນດຽວ, ສ່ວນປາຍສຸດຂອງກົບ ດອກ ແຍກເປັນ 5 ແສກ ບິດບັ່ງວ ບໍ່ເທົ່າກັນ, ເກສອນຜູ້ມີ 4 ອັນ. ເຕົ້າໄຂ ໜຶ່ງອັນ. ໝາກ ເປັນຝັກຍາວແປ, ຍາວ 40-50 ຊມ, ໝາກຂອງຂ້ອຍ ເວລາແກ່ ມີຂົນແລບ ດົກໜາເປັນຈຸ້ມໆ, ໝາກ ມີສີຂ້ອນຂ້າງສີກຳເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຢ່າງ ກາຍເວລາເຫັນ ຂ້ອຍ ນອກເສຍຈາກວ່າ ເຄີຍໄດ້ຮູ້ຈັກລົດຊາດຂອງຂ້ອຍແລ້ວ, ເວລາແກ່ ມັນຈະ ແຕກອອກເປັນ 2 ປ່ຽງ. ແກ່ນ ມີປົກບາງສີຂາວຫຸ້ມໄວ້. ຂ້ອຍອອກດອກເດືອນກັນຍາ ເຖິງເດືອນທັນວາ. ໝາກແກ່ ເດືອນກຸມພາ ເຖິງເດືອນມີນາ ຊຶ່ງຈະເຫັນແມ່ ຄ້າມາຈາກຊົນນະບົດໂດຍສະເພາະ ວາງຂ້ອຍຂາຍຢູ່ຕາມ ທ້ອງຕະຫຼາດ. ຂ້ອຍມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ໃຊ້ເປັນຢາ ໂດຍຖາກເອົາ ເປືອກຂອງລຳຕົ້ນມາອົມ ເພື່ອປົວອາການປາກເປັນກາງ, ແຊ່ເປືອກດິບ ແລ້ວກິນເປັນຢາປົວອາການເຫຼືອງ. ສ່ວນດອກ ເພິ່ນເອົາມາປຸງແຕ່ງ ອາຫານເອກກະລັກຢ່າງໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ໜຶ່ງດອກແລ້ວຊຸບ ປະສົມກັບຜັກອື່ນ ຫຼື ຊຸບ ແຕ່ມັນ, ປຸງແຕ່ງເປັນແຈ່ວ, ຕຳໃສ່ຂີງແລ້ວຂົ້ວ ຫຼື ເຮັດອົວດອກແຄ ຊຶ່ງ ເປັນອາຫານທີ່ແຊບ ຊອຍ ແລະ ຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ສ່ວນໝາກເພິ່ນເອົາມາເຜົາແລ້ວຕຳແຈ່ວເຊັ່ນ ດຽວກັນ. ນອກຈາກທີ່ເປັນຜັກ ທີ່ຊາວລາວ ມັກບໍລິໂພກແລ້ວຊຸມຊົນໃນເຂດພາກອີ ສານຂອງ ປະເທດໄທ ກໍ່ນິຍົມບໍລິໂພກດອກແຄເຊັ່ນດຽວກັນ.



ຮູບ 3: ຮູບໝາກ

ຮູບ 4: ຮູບໃບ

ຕົ້ນດອກແຄຂົນ ມີຕົ້ນກຳເນີດຢູ່ອາເຊຍຕາວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ດັ່ງເກີດ ແລະ ຮູ້ກັນດີໃນ ປະເທດ ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ, ມຽນມາ, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ອິນເດຍ.

ຕົ້ນໄມ້ ໃນຕະກຸນໄມ້ຍາງ [Ton Mai Nhang]

ຊື່ວິທະຍາສາດໂດຍລວມ: **Dipterocarpaceae**

ຊື່ທົ່ວໄປ ເປັນພາສາ ອັງກິດ: **Dipterocarp**

ຕະກຸນໄມ້ຍາງເປັນຕະກຸນພືດທີ່ໃຫຍ່ຕະກຸນໜຶ່ງທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໃນ ບ່ອນຕ່ຳຂອງເຂດ ຮ້ອນ ແລະ ຊຸມ ເປັນຈຸດໜັກ, ມີປະມານ 500 ຊະນິດເຊັ່ນ: ໄມ້ບາກ, ໄມ້ກຸງ, ໄມ້ຍາງ, ໄມ້ຊາດ, ໄມ້ຕະແບງ, ໄມ້ຈິກ, ໄມ້ຮັງ, ໄມ້ພາວ, ໄມ້ຊີ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ຫຼາຍຊະນິດ ໃນ ຕະກຸນນີ້ສ້າງທາດແຫຼວມີກິ່ນຂົວ ແລ້ວລະບາຍອອກມາຕາມຫຼາຍແບບ ດັ່ງອອກເປັນ ນ້ຳ ເອີ້ນວ່ານ້ຳມັນຍາງ ຊຶ່ງແມ່ນໃນກໍລະນີ ຕົ້ນຍາງ ແລະ ຕົ້ນຕະແບງ, ອອກມາເປັນ ວັດຖຸແຂງ ເອີ້ນວ່າຂີ້ຊີ ຊຶ່ງແມ່ນນ້ຳຢາງກ້າມຢູ່ເທິງຕົ້ນເປັນແທ່ງ ແຂງແລ້ວຕົກລົ້ນລົງ ເຊັ່ນ ໃນກໍລະນີ ໄມ້ຊີ, ໄມ້ຈິກ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນຂີ້ຕົກ ຊຶ່ງແມ່ນກໍລະ ນີ້ນ້ຳຢາງໄຫຼອອກນຳກິ່ງ, ນຳກິ່ງເລັກ ງ່າມອຍຕົກລົ້ນອອກມາ ເມື່ອມາເຖິງດິນແລ້ວຈຶ່ງ ເລີ່ມແຂງ ເຊັ່ນ ໃນກໍລະນີ ໄມ້ແຄນ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ທາດສານເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ ວິຖີຊີວິດຂອງ ຊຸມຊົນ ຊາວລາວ ມາແຕ່ຊຳນານ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ການກະຈາຍພັນມີຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ຄື: ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມຽນມາ, ໄທ, ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມາເລເຊຍ. ນອກຈາກບ່ອນກະຈາຍພັນຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວ ຍັງມີຊະນິດສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນຂອງທະວີບອາຟຼີກກາ ແລະ ຂອງທະວີບອາເມຣິ ກາໃຕ້ອີກດ້ວຍ. ສຳລັບໃນປະເທດລາວ ສ່ວນຫຼາຍພົບໃນພາກກາງ ລົງເຖິງພາກໃຕ້, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຂ້ອຍມັກຢູ່ ແມ່ນປ່າດົງດິບ ແລະ ປ່າປະສົມ ແຕ່ ກໍຍັງມີຢູ່ໃນ ປ່າໂຄກ ອາດປະປົນຢູ່ນຳຊະນິດອື່ນ ຫຼື ເປັນປ່າ ພືດຕະກຸນໄມ້ຍາງ ສົດກໍ່ມີ. ທຸກຊະ ນິດໃນຕະກຸນໄມ້ຍາງເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນ ມີຫຼາຍຊະນິດເປັນໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່, ມີຫູໃບຫຸ້ມ ຍອດອ່ອນໄວ້ ຈະຫຼົ້ນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໃບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລ້ວປະຮອຍໄວ້. ດອກ ອອກເປັນຊໍ່ສັ້ນໆ ແບບເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ, ເກີດຢູ່ລະຫວ່າງງ່າມໃບ ແລະ ປາຍຍອດ, ໄລຍະເວລາຊໍ່ດອກຍັງ ອ່ອນ ມີກາບຫຸ້ມຊໍ່ດອກ ແລ້ວລົ້ນອອກເມື່ອຊໍ່ດອກແກ່. ໝາກມີປົກໝາກແຕ່ 2 ເຖິງ 5 ປົກ, ປົກອ່ອນມີສີນ້ຳຕານອົມແດງ ສ່ວນປົກແກ່ ອອກສີແດງ. ປົກຂອງໝາກຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ໝາກປົວໄປໄດ້ໄກ ອັນມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການກະຈາຍພັນ. ດອກ ອອກລະຫວ່າງ ເດືອນ ມັງກອນ ເຖິງເດືອນມີນາ ແລະ ເປັນໝາກລະຫວ່າງເດືອນມີນາ ເຖິງເດືອນພຶດ ສະພາ. ປະຊາຊົນລາວໄດ້ນຳໃຊ້ພືດຕະກຸນໄມ້ຍາງເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ, ເຮັດເຄື່ອງຫັດ ຖະກຳໄມ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ. ຊາວບ້ານນຳໃຊ້ນ້ຳມັນຍາງ ທາໄມ້ເພື່ອກັນການເຈາະ ຂອງປວກ ແລະ ມອດແມງທັງຫຼາຍ, ໃຊ້ທາ ແລະ ຢາເຮືອ, ທາເຄື່ອງຈັກສານປະເພດ ຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດກະບອງ. ນອກນັ້ນຍັງໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງເຊັ່ນ: ລ້າງບາດແຜ, ເປັນ



ຮູບ 1: ຮູບລວມຂອງໄມ້ຍາງ

ຢາປ້ອງກັນນ້ຳຄັນກິນຕີນ ແລະ ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບໃນອຸດສາຫະກຳນ້ຳມືກພິມ ແລະ ສານເຄືອບຮູບ. ສຸດທ້າຍ ເພິ່ນຍັງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນພິທີກຳທາງສາດສະໜາບາງ ຢ່າງ ເຊັ່ນ: ນຳເອົາຂີ້ຊີມາປະສົມກັບນ້ຳ ມັນຍາງເພື່ອເຮັດເຮືອໄຟນ້ຳ, ນຳເອົາຂີ້ຊີ ມາເປັນສ່ວນປະກອບໃນການເຮັດກະໂທງ ໃນງານບຸນອອກພັນສາ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.



ຮູບ 2: ຮູບໃບ ແລະ ໝາກ

ຕົ້ນໄມ້ໃນຕະກຸນໄມ້ຍາງ ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ ປະເທດ ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມຽນມ້າ, ໄທ, ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳບູເຈຍ ແລະ ມາເລເຊຍ. ນອກນັ້ນຍັງພົບໃນ ເຂດຮ້ອນຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ແລະ ທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ອີກ.

ຕົ້ນກອຍ [Ton Koy]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Dioscorea hispida*


ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: Asiatic bitter yam

ຂ້ອຍແມ່ນຕົ້ນກອຍ ເປັນພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ມີຫົວຢູ່ໃຕ້ດິນ ແລະ ມີລຳຕົ້ນ ເປັນເຄືອຂະໜາດນ້ອຍ, ມີມືເກາະກ້ຽວຂຶ້ນຕາມລຳຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆ. ຂ້ອຍກະຈາຍພັນຢູ່ປະເທດບູຖານ, ຈີນ, ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ, ມຽນ ມ້າ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ຕະຫຼອດ ຮອດປະເທດ ປາປົວ ນິວກີເນຍ. ໃນລາວ ຂ້ອຍມັກເກີດຕາມປ່າປະສົມ ແລະ ປ່າດົງດິບແລ້ງ ໃນເຂດສູງ ແລະ ເຂດຕ່ຳ ໂດຍບໍ່ເລືອກ ດິນເລີຍ ແຕ່ບ່ອນຂ້ອຍມັກແທ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ມີດິນຊາຍແກມຕົມ, ບ່ອນມີຮີ່ມ ແລະ ລຽບຕາມແຄມແມ່ນ້ຳ ຫຼື ຫ້ວຍຮອງຄອງບຶງ. ເຄືອຂອງຂ້ອຍຍາວ 2-10 ມ, ມີໜາມແຂງ, ຫົວໃຕ້ດິນມີຮາກຂະໜາດນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍ ສິນສວ້າກັນຢູ່ ທັງເສັ້ນສັ້ນ ແລະ ເສັ້ນຍາວຕ່າງກັນ, ເປືອກຂອງຫົວກອຍ ອອກສີເຫຼືອງແກມສີນ້ຳຕານ, ຂ້າງໃນຂອງຫົວກອຍມີສີຂາວ. ໃບ ແມ່ນໃບປະສົມ ມີ 3 ໃບ ຍ່ອຍ, ໃບຍ່ອຍມີຮູບຮ່າງຫຼາຍແບບ ດັ່ງ: ຮູບຫອກ, ຮູບໄຂ່ປີ້ນ, ໂຄນໃບບ້ຽວ ບໍ່ສົມສ່ວນ. ແຜ່ນໃບໜຽວ, ຂອບໃບລຽບ. ຂະໜາດຂອງໃບ ຍາວ 14-19 ຊມ, ກວ້າງ 11-14 ຊມ. ດອກ ອອກເປັນຊໍ່ ອອກຕາມຂໍ້ ແລະ ຢູ່ງ່າມໃບ, ໝາກມີ 3 ລຽມ. ຕົ້ນກອຍ ອອກດອກເດືອນຕຸລາ ເຖິງເດືອນພະຈິກ. ໝາກແກ່ເດືອນກຸມພາ ເຖິງ



ຮູບ 1: ຮູບໃບ

ເດືອນມີນາ. ຫົວຂອງຂ້ອຍບັນຈຸທາດແປ້ງຫຼາຍ ເຊິ່ງເພິ່ນ ສາມາດກິນແທນເຂົ້າໄດ້ ແຕ່ພ້ອມດຽວ ກໍບັນຈຸທາດສານອານາຄອຍ ດັ່ງ ທາດສານດີອິດສະກໍຣິນ ຊຶ່ງເປັນສານເປື້ອເວລາເຮົາສຳພັດ ຈະເກີດອາການຄັນ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອປະຊາຊົນ ຊຸດເອົາຫົວກອຍມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານຕ້ອງ ໄດ້ປະຕິບັດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕາມ 2 ວິທີ ເຊັ່ນ: ດ້ວຍວິທີຕົ້ມ ແລະ ວິທີແຊ່, ດັ່ງເພິ່ນຝານຫົວກອຍເປັນແຜ່ນບາງໆແລ້ວ ເອົາມາຕົ້ມ ປຸງນ້ຳຫຼາຍເທື່ອຈົນໃຫ້ກອຍຈືດ ຫຼື ເອົາກອຍທີ່ຝານແລ້ວໃສ່ຂ້ອງ ຫຼືກະຢັງ ລົງແຊ່ໃນຫ້ວຍນ້ຳໄຫຼຈົນກວ່າມັນຈືດ ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ອາທິດ ແລ້ວນຳມາປຸງແຕ່ງເປັນຂອງຫວານ ຫຼື ໜັງກິນແທນເຂົ້າໃນເວລາຂາດເຂົ້າ. ນອກນັ້ນ, ຊາວຊົນນະບົດຍັງໃຊ້ເປັນຢາ ໂດຍຊອຍຫົວກອຍ 7 ປຸງ ແຊ່ນ້ຳກິນປົວອາການໄຂ້ຍຸງ. ປົກກະຕິ ການເກັບກູ້ເລີ້ມແຕ່ ເດືອນມີນາໄປ, ຫົວກອຍ ເກັບກູ້ແລ້ວສາມາດຮັກສາຄວາມສົດໄວ້ໄດ້ 3 ເຖິງ 4 ເດືອນ.



ຮູບ 2: ຮູບຫົວກອຍ

ຕົ້ນກອຍມີຕົ້ນກຳເນີດຢູ່ເອເຊຍຕາວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ພົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຢູ່ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.



ຮູບ 1: ຮູບຕົ້ນຜັກກູດ
ຮູບ 2: ຮູບໃບ ແລະ ຍອດອ່ອນ

ຕົ້ນ ຜັກກູດ [Ton Phak Kout] ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: Ferns

ຂ້ອຍແມ່ນຜັກກູດ ຊຶ່ງເປັນພືດທີ່ມີບໍ່ມີດອກ ມີການແຜ່ເຊື້ອດ້ວຍສະບໍ. ລຳຂອງຂ້ອຍມີທັງລຳຕັ້ງ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງກໍເປັນລຳເລືອຍຢູ່ໃຕ້ດິນ. ໃບ ແມ່ນໃບປະສົມເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ໃບອ່ອນ ແລະ ຍອດອ່ອນ ມ້ວນງໍ ຫຼື ກູດເຂົ້າຫາລຳຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງເອີ້ນຂ້ອຍວ່າ: ຜັກກູດ. ເມື່ອຕົ້ນຜັກກູດແກ່ແລ້ວ ຈຶ່ງເຫັນຖົງສະບໍຈັບຢູ່ຕາມພື້ນຂອງໃບແກ່ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ໃນທຳມະຊາດ ຜັກກູດ ມີຫຼາຍຕະກຸນ, ຫຼາຍສະກຸນ ແລະ ຫຼາຍຊະນິດ ມີທັງອົງອາໄສຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້, ເກີດແຜ່ຢູ່ຕາມລານຫີນ, ເກີດໃນດິນ ແລະ ເກີດ ຕົ້ນຈຸ່ມນ້ຳ. ໃນນັ້ນມີບາງຊະນິດກິນບໍ່ໄດ້ ແລະ ມີບາງຊະນິດກິນເປັນເຊັ່ນ: ຜັກກູດງ້ອງ, ຜັກກູດດົງ ແລະ ຜັກກູດຂາວ (ຜັກກູດເມືອກ), ຜັກກູດແດງ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ຂ້ອຍມີການກະຈາຍພັນກວ້າງຂວາງຫຼາຍ ໃຜ່ຈະບໍ່ເຄີຍເຫັນຜັກກູດແດ່, ຢູ່ປະເທດໜາວ ກໍມີບາງຊະນິດສະເພາະ ສ່ວນປະເທດຮ້ອນກວ່າ ຫຼື ປະເທດໜາວຫລາຍ ກໍຫາກມີຊະນິດຕ່າງອີກ. ສະເພາະ ປະເທດລາວ ຜັກກູດເກີດຢູ່ທຸກພາກ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກເກີດຕາມແຄມນ້ຳຫ້ວຍ



ບໍລິເວນເປີດແປນ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ປະຊາຊົນນິຍົມເກັບຜັກກູດມາປຸງແຕ່ງ ເປັນອາຫານ ໄດ້ທຸກລະດູການ ຊຶ່ງເພິ່ນເອົາມາປຸງແຕ່ງ ເປັນອາຫານຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງ ລວກຍອດອ່ອນ ເປັນຜັກກັບ, ເຮັດແກງກັບຊື່ນປະເພດຕ່າງໆ ຫຼື ເຮັດຊຸບປະສົມ ກັບຜັກຊະນິດອື່ນໆ. ໃນບາງຕຳລາຢາ ກໍຍັງໃຊ້ຮາກຂອງຜັກກູດປະສົມກັບ ສະຫມູນໄພຊະນິດອື່ນປຸງແຕ່ງເປັນຢາເຢັນ ແລະ ເປັນຢາບຳລຸງຜິວໜັງ.



ຮູບ 3: ຮູບຕົ້ນ ແລະ ໃບຜັກກູດທີ່ເກີດຢູ່ດິນຊະນິດໜຶ່ງ

ຕົ້ນໝາກແຄ່ນ [Ton Mark Khene]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Zanthoxylum limonella*

ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: Indian ivy-rue, Prickly ash, Sichuan pepper

ຂ້ອຍແມ່ນຕົ້ນໝາກແຄ່ນ ເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນ ມີອາຍຸຫຼາຍປີ, ຕາມເປືອກ ຂອງລຳຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງງາຂອງຂ້ອຍເຕັມແຕ່ໝາກ ທັງແຂງທັງແຫຼມ, ຄວາມພິເສດອີກອັນໜຶ່ງ ຂອງຂ້ອຍແມ່ນທຸກພາກສ່ວນຂອງຕົ້ນມີກິ່ນຫອມ, ມີລົດຊາດເຜັດ ແລະ ຮິນ. ຂ້ອຍ ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ອິນເດຍ ແລະ ຈີນ. ຊະນິດອື່ນນອນໃນສະກຸນດຽວກັນ ກໍມີຈຳນວນບໍ່ຫນ້ອຍ ທີ່ພົບຢູ່ ບ່ອນທີ່ມີອາກາດ ຮ້ອນ ໃນເຂດອົບອຸ່ນ ແລະ ເຂດພູມອາກາດເກືອບຮ້ອນ ແລະ ຊຸມໃນທົ່ວໂລກ. ສຳລັບປະເທດລາວພົບຫຼາຍຢູ່ທີ່ພາກເໜືອ ຕັ້ງແຕ່ແຂວງຫຼວງພະບາງຈົນເຖິງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຂ້ອຍມັກເກີດຕາມປ່າເຫຼົ້າ, ໄຮ່ຮ້າງ ຫຼື ເກີດປົນກັບຕົ້ນເຂົ້າຢູ່ຕາມໄຮ່ໃໝ່. ຂ້ອຍມີລຳຕົ້ນ ສູງ 7-10 ມ. ເສັ້ນຜ່າ ກາງ 15-20 ຊມ. ໃບ ແມ່ນໃບປະສົມແບບ ຂົນນົກ, ມີ 5-23 ຄູ່, ເນື້ອໃບມີຈຸດຕ່ອມນ້ຳມັນ ໃສໆ ແລະ ສ່ອງຊອດແຈກຢາຍຢູ່ ທົ່ວໆ ຄຽງຄູ່ໄປກັບຂົນແຂງດຶກໜາ ແລະ ໃບຍ່ອຍຍາວ 3-8 ຊມ, ກວາງ 2-4 ຊມ ມີຂອບເປັນແສກຕົ້ນແບບແຂ້ວເລື້ອຍ. ດອກສີຂາວ ອອກເປັນຊໍ່ເກີດຢູ່ປາຍຍອດ ຫຼື ຫຼົບໃບ. ໝາກອ່ອນມີສີຂຽວ, ເມື່ອແກ່ແລ້ວ ອອກສີດຳ, ເວລາ ແຫ້ງໝາກຈະແຕກ ເປັນປຸງປ່ຽບເທົ່າກັນ ແລະ ແກ່ນກໍຍັງຫອຍຢູ່ນຳດ້ວຍໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນຈະຕົກລົ້ນອອກ ຢ່າງຊື່ນເຊິ່ງ. ຖ້າໝາກແຫ້ງເທົ່າໃດຍິ່ງມີຄວາມຫອມ ແລະ ມີລົດຊາດຮິນ ແລະ ເຜັດເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນ ເອກກະລັກຂອງຂ້ອຍ ທີ່ຜູ້ຄົນນິຍົມແຕ່ໃດໆມາ. ດອກອອກ ໃນເດືອນກໍລະກົດເຖິງເດືອນສິງຫາ. ໝາກອອກໃນເດືອນກັນຍາ ເຖິງເດືອນຕຸລາ. ຕົ້ນໝາກແຄ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີຂອງ ຊາວລາວພາກເໜືອເຊັ່ນເພິ່ນນຳໃຊ້ຂ້ອຍເປັນ ຢາຫຼາຍຢ່າງດັ່ງ: ນຳໃຊ້ຮາກ ເປັນຢາປົວແຂ້ວແມງ ໂດຍຖາກເອົາເປືອກຮາກມາ ຫຍ້າອົມໄວ້ໄລຍະໜຶ່ງ; ຮາກ, ເປືອກ ແລະ ໃບ ຍັງໃຊ້ເປັນຢາປົວປະດິງຂໍ້ອີກ, ໃບ ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ພິດດ້ວຍການຕົ້ມອາບ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງນຳໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານ ເຊິ່ງເປັນເອກກະລັກຂອງຊາວພາກເໜືອ ຄື: ໃບອ່ອນໃຊ້ກັບລາບ ກັບກ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ ຫໍ່ໝົກປະເພດຊື່ນເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ໝາກໃຊ້ປຸງແຕ່ງແຈ້ວ, ປຸງແຕ່ງອາຫານປະເພດ ໝົກ ແລະ ປະເພດເອາະຫຼາມ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.



ຮູບ 1: ຮູບໃບ ແລະ ໝາກແຄ່ນແກ່ (ແຕກ)



ຮູບ 2: ຮູບດອກ ແລະ ຮູບລະອຽດຂອງດອກ ແລະ ຫມາກ
1: ຊໍ່ດອກ; 2-3: ດອກຍອຍ; 4: ຮູບຫມາກອ່ອນ ; 5: ຮູບຫມາກແກ່; 6: ຮູບແກ່ນ

ໝາກແຄ່ນ ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ ປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ອິນເດຍ ແລະ ຈີນ.



ຮູບ 1: ຮູບໃບ ແລະ ດອກ

ຕົ້ນ ສົ້ມປ່ອຍ ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ທຸກປະເທດໃນທະວີບເອເຊຍ

ຕົ້ນ ສົ້ມປ່ອຍ [Ton Som Poi]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Acacia concinna*

ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: piquant sappan, soap-pod wattle

ຂ້ອຍແມ່ນຕົ້ນສົ້ມປ່ອຍ ຊຶ່ງເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຕະກູນດຽວກັນກັບ ພວກກະຖິນ ແລະ ພວກຫຍ້າຫຍຸບ. ຕົ້ນສົ້ມປ່ອຍ ເວລາແກ່ ມີລຳຕົ້ນເທື່ອ ຄ້າຍເຄືອເກາະກ່າຍໄປ ຕາມ ຕົ້ນອື່ນ, ລຳຕົ້ນ ແຂງແກ່ນ, ທຸກພາກສ່ວນ ນັບທັງກ້ານໃບ ມີໝາມ.ໃບ, ຍອດອ່ອນ ແລະ ໝາກ ມີລົດສົ້ມ. ຂ້ອຍມີການກະຈາຍພັນຢູ່ທຸກປະເທດໃນທະວີບເອເຊຍ. ສະ ເພາະຢູ່ປະເທດລາວແມ່ນ ເພິ່ນພົບສົ້ມປ່ອຍແຕ່ເໜືອຕະຫຼອດໃຕ້. ສົ້ມປ່ອຍມັກເກີດ ຢູ່ຕາມປ່າເປີດແປນ ແລະ ປ່າດົງດິບແລ້ງ. ໃບ ເປັນໃບປະສົມແບບຂົນນົກ ຂັ້ນສອງ ຊຶ່ງມີໃບປະສົມຍ່ອຍ 4 ເຖິງ 16 ຄູ່. ດອກອອກເປັນຊໍ່ແບບກະຈຸກຄ້າຍຄືດອກກະຖິນ, ມີສີເຫຼືອງອ່ອນ. ໝາກເປັນຝັກ ມີຂໍ້ໆ. ລະດູອອກດອກ ແລະ ໝາກແຕ່ເດືອນທັນວາ ເຖິງເດືອນເມສາ. ຊາວລາວ ນຳໃຊ້ຂ້ອຍມາແຕ່ສະໄໝບູຮານ ໂດຍນຳເອົາໝາກຂອງ ຂ້ອຍທີ່ແກ່ແລ້ວມາແຊ່ ຫຼື ຕົ້ມໃສ່ນ້ຳເຂົ້າໝາ (ນ້ຳມວກ) ນຳມາ ສະຜົມ ແລະ ມີຄວາມ ເຊື່ອວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ຜົມດົກ ດຳ, ເປັນເງິາງາມ ແລະ ມີກິ່ນຫອມ. ສະນັ້ນຄົນໃນສະໄໝ ໃໝ່ຈຶ່ງນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວມາປະຫຍຸກໃຊ້ ໂດຍນຳເອົາໝາກສົ້ມປ່ອຍແກ່ມາປະ ສົມເປັນ ຢາສະຜົມຫຼາຍໆປະເພດ ເຊັ່ນ: ຢາສະຜົມຍີ່ຫໍ້ແຟຊາ ແລະ ຢາສະຜົມຍີ່ ຫໍ້ຊັນຊີລ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ນອກນັ້ນ ເພິ່ນຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ໝາກຂອງຂ້ອຍເຂົ້າໃນພິທີກຳ ທາງສາດສະໜາຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ໃນງານບຸນປີໃໝ່ລາວ ເອົາ ເຮັດນ້ຳສົງພູ ແລະ ເຮັດ ນ້ຳສູດລົດນ້ຳ ໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກເວລາ. ສ່ວນໃບ ແລະ ຍອດອ່ອນ ນຳໄປຕົ້ມສົ້ມປາ, ກົບ ແລະ ອຸ່ນ ຈະຊ່ວຍລົດຄວາມ ຄາວ ແລະ ເພີ່ມຄວາມແຊບ. ເພິ່ນຍັງໃຊ້ນ້ຳຕົ້ມ ຈາກໃບສົ້ມປ່ອຍເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງ ເຂົ້າແລ້ງພື້ນຊຶ່ງເປັນອາຫານເລີດ ລົດ ແລະ ນິຍົມຂອງ ຊາວລາວພາກເໜືອ.



ຮູບ 2: ໝາກອ່ອນ ແລະ ໝາກແກ່



ຮູບ 1: ຮູບຕົ້ນຕົ້ວໂດຍລວມ

ຮູບ 2: ຮູບຍອດອ່ອນ

ຮູບ 3: ຮູບລຳຕົ້ນ

ສົມຕົ້ວມີຕົ້ນກຳເນີດຢູ່ ໃນເຂດ ອິນໂດຈີນ.

ຕົ້ນ ຜັກຕົ້ວສົມ [Ton Phak Tew Som]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Cratoxylum formosum*

ຂ້ອຍແມ່ນ ຕົ້ນຜັກຕົ້ວສົມ, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນທີ່ມີອາຫານປີ, ມີເນື້ອໄມ້ແຂງແກ່ນ, ເປືອກລຳຕົ້ນມີໝາມແຂງ ແລະ ມີຢາງສີແດງ. ໃບອ່ອນ ອອກສີນ້ຳຕານແດງ ມີລົດສົມສະນັ້ນຈຶ່ງເອີ້ນວ່າຕົ້ວສົມເພື່ອຈຳແນກ ອອກຈາກ ຊະນິດໜຶ່ງອີກ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າຕົ້ນຕົ້ວຂົນ. ຂ້ອຍມີການກະຈາຍພັນຢູ່ຫຼາຍປະເທດຄື: ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ບູໄນ, ຟິລິບປິນ, ສິງກະໂປ ແລະ ມຽນມາ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຂ້ອຍມັກເກີດ ແມ່ນຢູ່ໃນປ່າປະສົມ, ປ່າດົງດິບແລ້ງ ແລະ ບາງຄັ້ງພົບຕາມປ່າໂຄກ. ລຳຕົ້ນຂອງຂ້ອຍສູງ 10-15 ມ, ເສັ້ນຜ່າກາງ 40-50 ຊມ. ໃບ ແມ່ນໃບດຽວ ຈັບພາບກັນ, ໃບ ມີຮູບສ່ວຍ, ໃບໜາ ແລະ ໜຽວ, ຜິວໃບກ້ຽງ, ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບແຫຼມ. ຂະໜາດໃບຍາວ 9-16.5 ຊມ, ກ້ວາງ 4-4.7 ຊມ. ດອກ ອອກເປັນຊໍ່ ເກີດຕາມຫຼີບໃບ, ຕາມກິ່ງ, ດອກ ສີຂາວແກມສີບົວ. ໝາກ ມີຮູບສ່ວຍ, ຍາວ 1-1.6 ຊມ, ເສັ້ນຜ່າກາງ 0.4-0.6 ຊມ. ກາບດອກຕິດຢູ່ນຳໝາກເລີຍຈົນກວ່າໝາກຈະແກ່ ແລະ ແຫ້ງຄາຕົ້ນເລີຍ. ດອກ ອອກໃນເດືອນມີນາເຖິງເດືອນມິຖຸນາ. ໝາກ ອອກໃນເດືອນກໍລະກົດເຖິງເດືອນຕຸລາ. ໃບອ່ອນ ແລະ ຍອດອ່ອນຂອງຂ້ອຍກິນເປັນຜັກກັບລາບກັບກ້ອຍ, ພັນເຂົ້າປຸ້ນ ແລະ ປຸງໃສ່ແກງເພື່ອເອົາລົດສົມ. ນອກຈາກໃຊ້ເປັນຜັກແລ້ວ ຮາກ ແລະ ໃບ ຍັງໃຊ້ຕົ້ມກິນ ເປັນຢາຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ, ຢາກິນເຂົ້າແຊບ, ແກ້ອາການອິດເມື່ອຍຫຼັງຄອດລູກ. ໃບ ຕຳປະສົມນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ໃຊ້ທາແກ້ໂລກຜິວໜັງ. ສ່ວນ ຢາງຈາກເປືອກລຳຕົ້ນ ໃຊ້ທາແກ້ຕຸ່ມຄັນຄາຍ ແລະ ໃຊ້ເປັນສີຍ້ອມຜ້ານຳອີກ.





ຕົ້ນ ແຂມ [Ton Khaem]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Thysanolaena latifolia*

ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: tiger grass, broom grass

ຂ້ອຍຄືຕົ້ນແຂມ ເປັນພືດຫຍ້າອາຍຸຫຼາຍປີ, ຢູ່ໃນຕະກູນດຽວກັນກັບ ພວກຕົ້ນໄຜ່, ຕົ້ນເຂົ້າ ແລະ ຫຍ້າແຜດ. ລຳຕົ້ນເກີດເປັນສຸມ, ມີເຫງົ້າໃຕ້ດິນ, ລຳຕົ້ນເປັນທໍ່ກົມໂກນກາງ, ມີຂໍ້ ແລະ ປ້ອງ ຊຶ່ງປົກຫຸ້ມດ້ວຍຂົນ ສີຂາວ ແກມສີທອງ. ຂ້ອຍມີການກະຈາຍພັນຢູ່ ຫຼາຍປະເທດ ຄື: ອິນເດຍ, ຈີນ, ມຽນມາ, ໄທ, ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳບູເຈຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຟິລິບປິນ. ຂ້ອຍມັກເກີດຕາມປ່າເຫຼົ້າ, ຕາມເຈ້ຍພູ, ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳ ບ່ອນມີດິນຊຸດໂຊມ. ລຳຕົ້ນຂອງຂ້ອຍ ສູງ 3-4 ມ. ໃບ ເປັນໃບດຽວ, ຮຽງສະຫຼັບກັນ, ເນື້ອໃບທັງຫຍາບ ທັງແຂງ, ຂອບໃບເປັນແສກງ, ປາຍໃບແຫຼມ, ກົກໃບມົນ ຫຼື ເປັນຮູບຫົວໃຈ, ໃບ ເປັນແຜ່ນ ຮູບແຂບ, ຍາວ 25-55 ຊມ., ກ້ວາງ 4-7 ຊມ. ກາບໃບ ກ້ຽງ ແລະ ຫຸ້ມເອົາລຳ. ດອກ ອອກເປັນຊໍ່ ຂະໜາດໃຫຍ່, ອອກຢູ່ປາຍຍອດ. ດອກອອກໃນເດືອນຕຸລາ ເຖິງເດືອນທັນວາ. ໝາກອອກໃນເດືອນທັນວາ ແກ່ໃນເດືອນມັງກອນ ເຖິງເດືອນກຸມພາ. ເຖິງວ່າ ຕົ້ນແຂມເປັນພືດທີ່ເກີດໃນປ່າກໍຕາມ ຕົ້ນນີ້ ຍັງມີການຕິດພັນກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນຊາວເອເຊຍມາແຕ່ຊ້ານານ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຢູ່ໃນເຮືອນຊານຂອງພວກເຈົ້າ ຕ້ອງມີຟອຍກວດ ທີ່ເຮັດດ້ວຍຕົ້ນແຂມ ແລະ ແມ່ນຊໍ່ດອກ ແລະ ກ້ານຊໍ່ດອກອີກ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ນຳມາມັດເຂົ້າກັນ ເຮັດຟອຍກວາດຕາມຫຼາຍແບບອີງຕາມຮີດຂອງຄົນ ພາກໃຕ້ ຫຼື ພາກເໜືອ ເພື່ອການໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ, ອັນເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຊາວຊົນນະບົດ ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ນອກນັ້ນ ຊໍ່ດອກແຂມ ຍັງເປັນສິນຄ້າສິ່ງອອກ ໄປປະເທດໄກ້ຄຽງ ເພື່ອ ປຸງແຕ່ງເປັນຟອຍກວດຕາມຮູບແບບຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ໜ້ອນຍັງນຳມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ເຊັ່ນ: ເຮັດແກງ, ເຮັດຊຸບ ແລະ ຕົ້ມກັບແຈ່ວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ເພິ່ນຍັງໃຊ້ຍອດອ່ອນ ແລະ ໃບ ລ້ຽງສັດ ເຊັ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ. ສຸດທ້າຍ ຕົ້ນແຂມຍັງຖືກນຳມາປູກເປັນໄມ້ປະດັບ ປະສົມກັບພັນພືດໄມ້ ປະດັບປະເພດອື່ນໄດ້ຢ່າງກົມກຽວທີ່ສຸດ.

ຮູບ 1: ຮູບຕົ້ນແຂມ ແລະ ຊໍ່ດອກ



ຮູບ 2: ຮູບຟອຍກວດ

ຕົ້ນແຂມ ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ ປະເທດ ອິນເດຍ, ຈີນ, ມຽນມ້າ, ໄທ, ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳບູເຈຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຟິລິບປິນ.

ເຄືອແຫມ [Kheua Hem]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Coscimum fenestratum*

ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: berberine, tumeric tree

ຂ້ອຍແມ່ນເຄືອແຫມ ເປັນພືດເຄືອ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເລືອຕາມໜ້າດິນ ຫຼື ເກາະກ່າຍ ຕາມຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ປາຍຍອດໂຄ້ງ, ເຄືອແຕກແຫງເປັນຍ່ານໆ. ເປືອກນອກຂອງເຄືອ ມີສີເທົາ, ເປືອກໃນສີເຫຼືອງ ແລະ ມີລົດຂົມ. ຖ້າຕັດຕາມລວງຂວາງຈະເຫັນເນື້ອໄມ້ສີເຫຼືອງ ມີລາຍແຊກຊ້ອນກັນເປັນຊັ້ນໆ. ຂ້ອຍມີການກະຈາຍພັນຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ ຄື: ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ຂ້ອຍມັກເກີດຕາມປ່າດົງດິບແລ້ງ ຫຼື ປ່າດົງດິບຊຸ່ມ. ເຄືອຂອງຂ້ອຍຍາວ 25-30 ມ. ເສັ້ນຜາກາງ 6-7 ຊມ. ໃບ ເປັນໃບດຽວ, ຈັບສະຫຼັບກັນ, ໃບຮູບໄຂ ຫຼັງໃບສີຂຽວ, ທ້ອງໃບສີຂາວປົນສີເທົາ, ກົກໃບມົນ ຫຼື ຕັດ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຂອບໃບລຽບ, ຂະໜາດ ຂອງໃບ 9-15x6-8 ຊມ. ເສັ້ນກາງໃບແຕກອອກຈາກກົກໃບ 2 ຄູ່ ແລວໂຄ້ງໄປທາງປາຍໃບ. ດອກອອກເປັນຊໍຕາມຂໍ້, ດອກສີຂຽວ. ໝາກມີສີເຫຼືອງປົນສີເທົາ, ມີ 1 ເມັດ ມີລົດຂົມ. ດອກອອກໃນເດືອນມິຖຸນາ ເຖິງເດືອນກໍລະກົດ. ໝາກ ອອກ ໃນເດືອນກໍລະກົດ ເຖິງເດືອນທັນວາ. ຢູ່ລາວ ເພິ່ນນຳໃຊ້ເຄືອແຫມເປັນວັດຖຸດິບ ສຳລັບການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ເພື່ອເອົາສີເຫຼືອງ ແລະ ຜະລິດເປັນຢາປົວພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຢາປົວທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງ, ຕັບອັກເສບ. ເຄືອແຫມຍັງໃຊ້ເປັນຢາປົວພະຍາດຕາຊຶມເຊື້ອ, ຕາແດງ. ທາດສານເບີເບີຣິນທີ່ສະກັດຈາກເຄືອແຫມຍັງມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງອີກ ຄື: ຮັກສາຄວາມດັນເລືອດສູງ ໃຫ້ປົກກະຕິ, ປົວອາການພະຍາດໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ສາມາດລຸດຜ່ອນຄວາມຕຸ້ຍໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດຂັບໄລ່ສານເຄີມທີ່ຕົກຄ້າງໃນຮ່າງກາຍ, ປົວພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ອຳມະພາດ. ປະຊາຊົນເກັບກູ້ເອົາເຄືອແຫມໄດ້ຕະຫຼອດປີແລ້ວຂາຍເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກໃນຮູບແບບສິດ ຫຼືຝານເປັນແຜ່ນບາງໆຕາກແຫ້ງເພື່ອສາມາດນຳໃຊ້ແບບງ່າຍດາຍໄດ້ໂລດ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ປາລິມານຂອງເຄືອແຫມກໍ່ນ້ອຍເຕັມທີ່ ເນື່ອງມາຈາກການຊຸດຄົ້ນເກີນຂອບເຂດ ແລະ ແບບທຳລາຍ ດ້ວຍການຊຸດຄົ້ນເອົາແຕ່ເຄືອໃຫຍ່ ສ່ວນທີ່ເປັນປາຍເຄືອຖືກຕັດຖິ້ມ ແລະ ເຄືອນ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກຜູ້ເກັບກູ້ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ພືດຊະນິດນີ້ ກໍ່ໄດ້ກາຍເປັນພືດທີ່ຫາຍາກ.



ຮູບ 1: ຮູບໃບ ແລະ ໝາກອ່ອນ



ຮູບ 2: ຮູບເຄືອແກ່ ແລະ ໝາກ

ຮູບ 3: ຮູບເຄືອແກ່ ຕັດຕາມລວງຂວາງ

ເຄືອແຫມ ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ



ຮູບ 1: ຮູບເຄືອຂອງຢາຫົວ

ຢາຫົວມີການກະຈາຍພັນຢູ່ປະເທດອິນເດຍ, ມຽນມາ, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ, ໄທ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ.

ຢາຫົວ [Ya Houa]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Smilax glabra*) , ຊື່ທົ່ວໄປ ເປັນພາສາ ອັງກິດ: Sarsaparilla root

ຂ້ອຍແມ່ນຢາຫົວ ເປັນພືດເຄືອຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ຫາກແຂງແກ່ນ, ເຄືອ ມີສີຂຽວ, ມີ ຫົວຢູ່ໃຕ້ດິນ, ຢູ່ຕາມຂໍ້ ມີມີເກາະ ເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເກາະຫ້ອຍຕາມພືດຫຍ້າທີ່ຢູ່ໄກ້ ຄຽງ. ຂ້ອຍມີການກະຈາຍພັນຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ຄື: ພາກເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ, ມຽນມາ, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ, ໄທ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ຂ້ອຍ ມັກເກີດຕາມປ່າດົງດິບ, ປ່າປະສົມແລ້ງ, ເກີດຕາມພູເຂົາ ແລະ ຕາມແຄມຫ້ວຍ. ເຄືອ ຂອງຂ້ອຍຍາວ 5-6 ມ, ເສັ້ນຜ່າກາງປະມານ 0.4-1 ຊມ. ເນື້ອຫົວແຂງແກ່ນ ແລະ ມີ ສີນ້ຳຕານແດງ, ຫົວ ຍາວ 40-80 ຊມ, ເສັ້ນຜ່າກາງ 3-5 ຊມ. ໃບ ເປັນໃບດຽວ, ຮຽງ ສະຫຼັບກັນ, ໃບ ມີຮູບໄຂ່, ເນື້ອໃບແຂງ, ຜິວໃບກັງຽ ແລະ ເຫຼື້ອມເປັນເງິາງາມ, ຂອບ ໃບລຽບ, ປາຍໃບແລະກົກໃບແຫຼມ ຫຼື ກົກໃບເປັນຮູບຫົວໃຈ, ເສັ້ນກາງໃບ ມີ 3 ເສັ້ນ ອອກຈາກກົກໃບ. ດອກອອກເປັນຊໍ່ ເກີດຕາມຫຼັບໃບ. ດອກອອກລະຫວ່າງ ເດືອນ ພຶດສະພາ ເຖິງ ກໍລະກົດ. ໝາກອອກໃນເດືອນກໍລະກົດ ເຖິງທັນວາ. ຊາວລາວ ຫຼາຍໆ ເຜົ່າໄດ້ມີຄວາມເຊື່ອຖືໃນສັບພະຄຸນ ຂອງຢາຫົວມາໄດ້ ຫຼາຍເຊັ່ນຄືນ ແລ້ວ, ເພິ່ນນຳ ໃຊ້ຢາຫົວ ເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັກໃນສູດຢາພື້ນເມືອງ ດັ່ງ ຕົ້ມຢາຫົວ ຕົ້ມ ແກ້ພິດທາດ ເປື້ອໃນຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍລະລາຍອາຫານ, ເຮັດໃຫ້ກະດູກສັນຫຼັງແຂງແຮງ, ແກ້ເຈັບຂໍ້ ກະດູກ, ໃຊ້ເປັນຢາຟອກເລືອດ, ໃຊ້ ຂັບນ້ຳເຫຼືອ, ໃຊ້ເປັນນ້ຳດື່ມ ຂອງແມ່ຢູ່ກຳ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ນອກນັ້ນ ໂຮງງານຜະລິດຢາ ຍັງໄດ້ຜະລິດເປັນເຄື່ອງດື່ມ ບຳລຸງສຸຂະພາບອີກດ້ວຍ.



ຮູບ 2: ຮູບຫົວ



ຮູບ 1: ຮູບໃບ ແລະ ໝາກອ່ອນ

ຮູບ 2: ຮູບຜະລິດຕະພັນຂອງເປືອກບົງ

ຕົ້ນຢາງບົງມີການກະຈາຍພັນຢູ່ ປະເທດ ອິນເດຍ, ພະມ້າ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟິລິບປິນ.

ຕົ້ນ ຢາງບົງ [Ton Yang Bong]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Litsea monopetala*, ຕົ້ນ ຢາງບົງຂາວ; *Persea gamblei* ຫຼື *Persea kurzii*, ຕົ້ນ ຢາງບົງແດງ; *Nothaphoebe umbelliflora*, ຕົ້ນບົງມີ

ຂ້ອຍແມ່ນຕົ້ນຢາງບົງ ຫຼື ຕົ້ນບົງ ຊຶ່ງມີຄຸນລັກສະນະພິເສດຄືເປືອກຂອງຂ້ອຍມີຢາງໜຽວຄ້າຍຄືກາວ ເມື່ອບົດເປືອກໃຫ້ມຸ່ນ ສາມາດປັ້ນເປັນກ້ອນໄດ້. ຕົ້ນຢາງບົງທີ່ນຳໃຊ້ໃນປະເທດລາວມີ 3 ຊະນິດ ຄື: ຢາງບົງຂາວ, ຢາງບົງແດງ ແລະ ບົງມີ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປ ຊາວບ້ານເອີ້ນຕົ້ນຢາງບົງ ຫຼື ຕົ້ນບົງ ກໍ່ໝາຍເຖິງທັງກຸ່ມຕົ້ນບົງນັ້ນເອງ. ຂ້ອຍມີການກະຈາຍພັນຢູ່ ຫຼາຍປະເທດ ຄື: ອິນເດຍ, ມຽນມາ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟິລິບປິນ. ຕົ້ນຢາງບົງຂາວ ມັກເກີດໃນປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າປະສົມ ສ່ວນຢາງບົງແດງ ແລະ ບົງມີ ມັກເກີດໃນປ່າດົງດິບ ແລະ ປ່າປະສົມ. ຕົ້ນບົງເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນ ເປືອກນອກສີເທົາ, ເປືອກມີຢາງໜຽວ, ມີກິ່ນຫອມ. ໃບ ແມ່ນໃບດຽວ, ຮຽງສະຫຼັບ ຫຼື ວຽນສະຫຼັບຢູ່ໃກ້ກັບປາຍຍອດ, ກົກໃບ ແລະ ປາຍໃບມີນ ຫຼື ປາຍແຫຼມຕາງກັນເລັກນ້ອຍພາຍໃນກຸ່ມ, ຂອບໃບລຽບ, ໃບ ມີຮູບໄຂ່ປັ້ນ ຫຼື ຮູບສ່ວຍ. ດອກອອກເປັນຊໍ່ ເກີດຕາມຫຼັບໃບ ແລະ ປາຍຍອດ. ຕົ້ນບົງຂາວ ອອກດອກໃນເດືອນທັນວາ ເຖິງເດືອນມັງກອນ ແລະ ໝາກ ອອກໃນເດືອນກຸມພາ ເຖິງເດືອນເມສາ. ຕົ້ນບົງແດງ ແລະ ບົງມີ ອອກດອກໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ເຖິງເດືອນສິງຫາ ແລະ ໝາກ ອອກໃນເດືອນສິງຫາ ເຖິງເດືອນກັນຍາ. ປະຊາຊົນ ເກັບກູ້ ເປືອກບົງ ແລະ ຢາງບົງໄດ້ຕະຫຼອດປີ ເພື່ອນຳໄປຂາຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກປະເທດໃກ້ຄຽງ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ. ທູບທີ່ພວກເຈົ້າ ໄດ້ບູຊາພະພຸດທະເຈົ້າ ນັ້ນແມ່ນເຮັດມາຈາກເປືອກຂອງຂ້ອຍໂດຍການບົດໃຫ້ມຸ່ນແລ້ວເຮັດເປັນເສັ້ນ. ນອກນັ້ນ ຍັງນຳມາເຮັດທູບໄລ່ຍຸງ ແລະ ໃຊ້ທາໄມ້ເພື່ອປ້ອງກັນການເຈາະຂອງພວກປວກ ແລະ ມອດ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ໃນສະໄໝກ່ອນ ຄົນບູຮານໄດ້ນຳໃຊ້ເປືອກບົງຂາວບົດໃຫ້ມຸ່ນ ປະສົມກັບດິນແລ້ວປັ້ນເປັນຮູບທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ພະພຸດທະຮູບແບບຕ່າງໆ ໄວ້ໃນວັດວາອາຮາມ ຫຼື ເຮັດເປັນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍເຊັ່ນ: ປັ້ນໝໍ້, ຫູ້ໄຫ ແລະ ອື່ນໆ.





ຮູບ 1: ຮູບເອື້ອງດິນໃບຫມາກ


ຕົ້ນ ດອກເຜິ້ງ [Ton Dok Pheung]

ຊື່ວິທະຍາສາດໂດຍລວມ: Orchidaceae, ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: Orchid

ຂ້ອຍແມ່ນຕົ້ນດອກເຜິ້ງ ຫຼືຕົ້ນເອື້ອງ ເປັນພືດຕະກູນໜຶ່ງທີ່ມີການ ວິວັດທະນາການ ສູງສຸດໃນກຸ່ມພືດໃບລ້ຽງດຽວ. ເປັນພືດຫຍ້າ ຂະໜາດນ້ອຍ, ແຕ່ ລະດັບ ມີລີແມັດ ເຖິງ 3 ແມັດ, ມີອາຍຸຫຼາຍປີ. ພືດຕະກູນນີ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານຊະນິດ ແລະ ດ້ານ ລັກສະນະ. ຂ້ອຍມີດອກທີ່ມີຮູບຮ່າງ ແລະ ສີສັນທີ່ສວຍງາມ ແລະ ເປັນທີ່ປະທັບຕາ ຕ້ອງໃຈຂອງຄົນທີ່ພົບເຫັນ. ຕົ້ນດອກເຜິ້ງຫຼາຍຊະນິດ ອາໄສຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ ແລະ ອາໄສຕາມດານຫີນ ເຊັ່ນ: ເອື້ອງສາຍໄໝ, ເອື້ອງຄຳ, ຊ້າງກະ, ເອື້ອງຕານາງ, ເອື້ອງລຳຕໍ່ ແລະ ອື່ນໆ. ດອກເຜິ້ງຈຳພວກນີ້ ມີລຳຕົ້ນສ່ວນຫຼາຍເປັນຂໍ້ໆ, ມີຮາກຈັບເກາະ ແລະ ຮາກອາກາດເກີດອອກຈາກຂໍ້. ນອກນັ້ນ, ມີກຸ່ມດອກເຜິ້ງ ຫຼາຍຊະນິດ ອາໄສຢູ່ຕາມ ໜ້າດິນ ເອີ້ນວ່າ: ດອກເຜິ້ງດິນ ເຊັ່ນ: ຫຍ້າໃບລາຍ, ເກີບນາລີ, ນາງອົວ ແລະ ອື່ນໆ. ຂ້ອຍຂະຫຍາຍພັນຢູ່ທົ່ວໄປ ໃນເຂດພູມອາກາດອົບອຸ່ນ ແລະ ໃນເຂດອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມເປັນສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ມີຫຼາຍໆຊະນິດເກີດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນ ອອກສູງໃຕ້. ຂ້ອຍມັກເກີດຕາມປ່າດົງດິບ, ປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າປະສົມ. ລະດູອອກ ດອກຂອງດອກເຜິ້ງ ແມ່ນທຸກລະດູການ ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຊະນິດຂອງດອກເຜິ້ງ. ຂ້ອຍ ເປັນໄມ້ປະດັບທີ່ຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍ ມັກແລະຫຼົງໄຫຼໃນຄວາມງາມຂອງຂ້ອຍ ເຂົາເຈົ້າມັກ ປູກຂ້ອຍ ຫ້ອຍຕາມຕົ້ນໄມ້ ປະດັບໄວ້ຕາມເຮືອນຊານ, ຕາມອາຄານ ແລະ ຫ້ອງການ ຕ່າງໆ. ນອກຈາກຈະໃຊ້ປະດັບ ແລ້ວຕົ້ນດອກເຜິ້ງ ຍັງໃຊ້ເປັນພືດສະໝຸນໄພອີກ ດັ່ງ ທີ່ຊາວຈີນ, ຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ຍັງໃຊ້ໃນບາງຕຳລາຢາພື້ນເມືອງຂອງຊາວລາວ ນຳອີກ. ປະຊາຊົນ ສ່ວນຫຼາຍເກັບກູ້ຂ້ອຍມາຂາຍ ໃນເວລາທີ່ອອກດອກ ຈະໄດ້ ລາຄາແພງ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຄົນທີ່ພົບເຫັນ ເຊັ່ນ: ເອື້ອງເກີບນາລີ, ຊ້າງກະ, ເອື້ອງຄຳ ແລະ ອື່ນໆ. ດອກເຜິ້ງຫຼາຍຊະນິດໃນສະກຸນຫວາຍ ຖືກຂາຍສົ່ງອອກປະເທດ ຈີນໃນປາລິມານຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ບາງຊະນິດມີຈຳນວນຫຼຸດລົງແລະກາຍເປັນທີ່ຫາຍາກ ຫຼື ບາງຄັ້ງກໍ່ສູນພັນໄປເສຍແລ້ວ. ຕາມຄວາມຈິງ ດອກເຜິ້ງທຸກຊະນິດ ຖືກຈັດໃນບັນຊີ ແດງຕາມສິນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າລະຫວ່າງ ຊາດ ເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ <ໄຊແຕສ> (CITES). ດັ່ງນັ້ນ ຕາມລະບຽບການແລ້ວ ການຄ້າ ຂາຍພືດຕະກູນນີ້ ຈຶ່ງເປັນການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ຮູບ 1-2: ຮູບດອກເຜິ້ງດິນ

ຮູບ 3: ຮູບດອກເຜິ້ງອີງອາໄສຕາມຕົ້ນໄມ້ ແລະ ດານຫີນ



ຮູບ 2: ຮູບດອກເຜິ້ງ ເກີບນາລີ
ຮູບ 3: ເອື້ອງໄຕຣ



ຕົ້ນ ດອກເຜິ້ງ ມີການກະຈາຍພັນ ຢູ່ໃນທຸກພູມອາກາດ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນເຂດ
ຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມດອກເຜິ້ງເກີດແບບອົງອາໄສຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ ແລະ
ດານຫີນ.



ຮູບ 1: ຮູບລຳຕົ້ນໝາກແໜ່ງ

ຕົ້ນ ໝາກແໜ່ງ [Ton Mrak Neng]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Amomum* spp.

ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: cardamom, amomum, grains of paradise plant

ຂ້ອຍແມ່ນຕົ້ນໝາກແໜ່ງ, ເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງໃນຕະກຸນດຽວກັນກັບ ພວກຂົງ-ຂ່າ, ຫວ້ານຕູບໝູບ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ລັກສະນະສະເພາະຂອງພືດໃນຕະກຸນນີ້ ແມ່ນທຸກໝາກສ່ວນຂອງຕົ້ນມີກິ່ນຫອມ ຍ້ອນບັນຈຸທາດສານ ລະເທິຍສະເພາະຕົວ. ໝາກແໜ່ງ ທີ່ເກີດໃນທຳມະຊາດຂອງບ້ານເຮົາ ມີຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ໝາກແໜ່ງຂຽວ, ໝາກແໜ່ງແດງ, ໝາກແໜ່ງຫົວໂລ້ນ, ... ຂ້ອຍກະຈາຍພັນເອງຕາມທຳມະຊາດ, ຍັງພົບຢູ່ ໃນປະເທດ ຈີນ, ອິນເດຍ, ມຽນມ້າ, ໄທ, ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ມາເລເຊຍ ອີກ. ສຳລັບປະເທດລາວ ເພິ່ນພົບຕົ້ນໝາກແໜ່ງແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້ ຕັ້ງແຕ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ລົງເຖິງແຂວງອັດຕະປື. ຂ້ອຍມັກເກີດຕາມປ່າດົງດິບ, ປ່າປະສົມ ຕາມປ່າໂລ່ງແຈ້ງ ບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມຊຸມຊື່ນຫຼາຍ. ປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການປູກຕົ້ນໝາກແໜ່ງເປັນສິນຄ້າສິ່ງອອກຂອງປະເທດເນປານ ແລະ ປະເທດກວາເຕມາລາ ລາຍໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ໃນໂລກ. ໝາກແໜ່ງເປັນພືດ ມີອາຍຸຫຼາຍປີ, ມີລະບົບລຳຢູ່ໃຕ້ດິນ, ກາບໃບໂອບຊອນກັນຫຼາຍໆຊັ້ນ ເປັນລຳຕົ້ນຢູ່ເທິງໜ້າດິນ, ໃບ ເປັນໃບດ່ຽວ, ເປັນແຜ່ນຍາວ ຮູບຂອບຂະໜານ, ຈັບສະຫຼັບກັນ. ດອກ ອອກເປັນຊໍ່ ປົ່ງອອກຈາກເທົ້າໂດຍກົງຄືກັບພວກຫວ້ານໄຟ, ຂີ້ໝັນ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ຫຼາຍຊະນິດໃນກຸ່ມ ຕົ້ນໝາກແໜ່ງ ມີດອກອອກສີຂາວ, ດອກ ອອກໃນເດືອນເມສາ ເຖິງເດືອນມິຖຸນາ. ໝາກມີຮູບຮ່າງຫຼາຍແບບ ເຊັ່ນ: ໝາກຮູບກົມ, ຮູບສາມຫຼ່ຽມຫຼື ຮູບໝວຍໄຂ່ ເປືອກກ້ຽງ ຫຼື ມີໜາມອ່ອນໆ, ຫມາກຈັບເປັນແຊງແໜ້ນໜ້າອອກຢູ່ຕີນຕົ້ນ ແລະ ໃນທ່າຕັ້ງ. ໝາກອອກໃນເດືອນມິຖຸນາເຖິງເດືອນສິງຫາ. ການນຳໃຊ້ໝາກແໜ່ງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນທາງດ້ານການແພດແຜນບູຮານ ຊຶ່ງເພິ່ນໃຊ້ເປັນຢາຕິເຈັບທ້ອງ, ແກ້ທ້ອງຍິ່ງ, ຊ່ວຍລະລາຍອາຫານ, ປົວພະຍາດອະຫິວາໂດຍປະສົມກັບຢາອື່ນ ແລະ ຢາປົວອາການເຈັບແຂ້ວແມງ ໂດຍອົມຝຸ່ນໝາກແໜ່ງ. ນອກນັ້ນ ເພິ່ນຍັງນຳໃຊ້ໝາກແໜ່ງເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ເພື່ອເສີມ ກິ່ນໃຫ້ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ. ນອກຈາກນຳໃຊ້ ດັ່ງທີ່ກ່າວມາແລ້ວ ໝາກແໜ່ງ ຍັງເປັນເປັນສິນຄ້າສິ່ງອອກທີ່ສຳຄັນຂອງລາວອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງມາຈາກ ການເກັບກູ້ໝາກແໜ່ງໃນປ່າທຳມະຊາດຂອງຊາວບ້ານນັ້ນເອງ ອັນເປັນການ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນສົ່ງໄປປະເທດຈີນ, ເກົາຫຼີ ແລະ ໄທ ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນ ຢາພື້ນເມືອງຕາມສູດຂອງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ.



ຮູບ 2: ຮູບແຊງໝາກ

ໝາກແໜ່ງມີການກະຈາຍພັນ ຢູ່ປະເທດ ຈີນ, ອິນເດຍ, ມຽນມາ, ໄທ, ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ອິດສະຕະເລຍ ແລະ ມາເລເຊຍ.

ຫວາຍ [Wai]

ຊື່ວິທະຍາສາດໂດຍລວມ: *Calamus* spp.

ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາອັງກິດ: rattan palm

ຂ້ອຍແມ່ນຕົ້ນຫວາຍ ຊຶ່ງນອນໃນຕະກູນດຽວກັນກັບຕົ້ນພ້າວ, ຕົ້ນໝາກ ແລະ ຕົ້ນຕານ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຕ່າງຈາກຊະນິດອື່ນໃນຕະກູນ ຢູ່ບ່ອນວ່າ ລຳຕົ້ນມີໜາມ, ເມື່ອແກ່ ລຳຕົ້ນຈະເປັນເຄືອ ພາດເກາະໃສ່ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ງ່າໄມ້ອື່ນ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມັກເອີ້ນຂ້ອຍວ່າ “ເຄືອຫວາຍ” ແລະ ຕ່າງອີກອັນໜຶ່ງ ແມ່ນໝາກຫວາຍ ມີເປືອກຫຸ້ມເປັນເກັດໆ. ຢູ່ຕາມທຳມະຊາດຂອງບ້ານເຮົາ ຫວາຍມີຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຫວາຍແດງ (*Calamus gurub*), ຫວາຍຫາງໝູ (*Calamus solitarius*), ຫວາຍຂົມ (*Calamus palustris*), ຫວາຍຂີ້ໄກ່ (*Myrialepis paradoxa*), ຫວາຍພຸ່ມ (*Calamus acanthophyllus*), ຫວາຍຫຼຸນ (*Calamus poilanei*) ດັ່ງນີ້ ເປັນຕົ້ນ. ຂ້ອຍຂະຫຍາຍພັນຢູ່ທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ອາຟຼິກກາ, ອິນເດຍ, ສິລັງກາ, ບໍລິເວນພູຫິມາໄລ, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ລົງມາຈົນເຖິງແຫຼມມາເລເຊຍເຊັ່ນ: ມຽນມາ, ໄທ, ລາວ, ຫວຽດນາມ, ມາເລເຊຍ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ສຳລັບໃນປະເທດລາວພົບແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້, ຫວາຍເກີດຢູ່ໃນດິນທຸກປະເພດ ຕາມປ່າຫຼາຍຊະນິດ, ໃນທຸກສະພາບພູມມີອາກາດ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍ ເກີດໃນປ່າດົງດິບ, ປ່າປະສົມ ໃນບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ຕົ້ນຫວາຍ ທຸກຊະນິດ ເກີດເປັນສຸມ, ລຳຕົ້ນມີກາບຫຸ້ມ, ມີໜາມແຫຼມ ແລະ ແຂງ, ແຕ່ຈະຫຼິ້ນອອກໄປເມື່ອລຳແກ່, ມີທັງ ຊະນິດທີ່ມີລຳຍາວເຖິງ 150 ແມັດ, ຊະນິດທີ່ມີລຳສັ້ນພຽງແຕ່ 50 ຊມ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງລຳ ແຕ່ 0.3 ຊມ. ເຖິງ 20 ຊມ. ໃບ ແມ່ນໃບປະສົມແບບຂົນນົກ ຄ້າຍຄືໃບພ້າວ, ສ່ວນປະກອບຂອງໃບ ມີ: ກາບໃບທີ່ຫຍາບ, ກ້ານໃບ ຍາວ ແລະ ແຂງ, ໃບຍ່ອຍ ແລະ ມີເກາະສຳລັບບາງຊະນິດ. ຊໍ່ດອກ ອອກເປັນຊໍ່ຍາວ ອອກຢູ່ປາຍຍອດຂອງລຳ ຫຼື ຕາມຂໍ້ຂອງລຳຕົ້ນ, ມີຊໍ່ດອກຜູ້ ແລະ ຊໍ່ດອກແມ່ຕ່າງກັນ ຢູ່ພາຍໃນສຸມດຽວກັນ. ໝາກຂອງຂ້ອຍເປັນຊັ້ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເພີ່ນໃຊ້ໃນການຈັດຈຳແນກຊະນິດແບບງ່າຍໆໄດ້ ເພາະແຕ່ລະຊະນິດມີຈຸດພິເສດ ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ນອກນັ້ນ ລະດູອອກດອກ ແລະ ໝາກຫວາຍ ແຕ່ລະຊະນິດກໍ່ແຕກຕ່າງກັນອີກ, ສ່ວນຫຼາຍອອກຕະຫຼອດປີ ແຕ່ມີຫວາຍບາງຊະນິດເວລາເປັນໝາກ ຈະໃຊ້ເວລາເປັນປີ ໝາກຈຶ່ງສຸກໄດ້. ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ຫວາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແຕ່ສະໄໝບູຮານມາ ດັ່ງຍອດອ່ອນຂອງຫວາຍ ເພີ່ນໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານຍອດນິຍົມຂອງຄົນລາວທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ແຈ່ວຫວາຍ, ອ່ອມຫວາຍ, ເປັນຜັກກັບລາບ,... ດັ່ງນີ້ ເປັນຕົ້ນ. ພວກເຈົ້າເຄີຍ ເຫັນເຂົາເຈົ້າຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກຳຕາມຮ້ານ ຫຼື ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ເຊັ່ນ: ພາເຂົ້າ, ຕິບເຂົ້າ, ຂັນໃສ່ບາດ, ກະຕ່າ



ແລະ ເຄື່ອງເພີນີເຈີທີ່ສວຍງາມ ນັ້ນແມ່ນເຮັດມາຈາກລຳ ຫຼື ເຄືອຂອງຂ້ອຍນັ້ນເອງ ເພາະມັນມີຄວາມໝັ້ນໜຽວ ແຕ່ສາມາດ ປັບດັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບຊົງທີ່ຕ້ອງການໄດ້ງ່າຍ ຄຽງຄູ່ໄປກັບຄວາມສະງ່າງາມ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ ຕະຫຼາດຄວາມຕ້ອງການຫວາຍ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຈຶ່ງສູງຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເລີຍອັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຖືກຊຸດຄົ້ນ ຫຼາຍຈົນວ່າຫວາຍບາງຊະນິດ ຖືກຈັດເປັນພືດຫາຍາກແລ້ວ ດັ່ງ ຫວາຍທູນ ຍ້ອນ ລຳໃຫຍ່ ລາຄາສູງ, ຫວາຍຫາງໜູ ຍ້ອນແຂງ ແລະ ທົນທານ,...ແຕ່ຍັງດີ ໃນປະເທດ ເຮົາ ຍັງມີຜູ້ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ລິເລີ່ມປູກຫວາຍ ເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອການບໍລິໂພກ ແລະ ໃຊ້ຜລິດເຄື່ອງຫັດຖະກຳ. ຫວາຍເປັນພືດ ທີ່ທົນທານ ແລະ ເຕີບໂຕຊ້າ ພວກ ເຮົາຄວນເພີ່ມທະວີການປູກຕົ້ນຫວາຍ ເພື່ອການຊົມໃຊ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ລຸ້ນລູກຫຼານ ໄດ້ຊົມໃຊ້ ສົມກັບຄຸນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງຫວາຍດ້ວຍ.



ຮູບ 1: ຮູບຊົງສ່ວນຂອງຕົ້ນຫວາຍ

ຮູບ 2: ຮູບແຂງໝາກ

ຫວາຍມີການກະຈາຍພັນ ຢູ່ເອເຊຍ: ອິນເດຍ, ສິລັງກາ, ບໍລິເວນ ພູຫິມາໄລ, ພາກໃຕ້ຂອງ ຈີນ, ມາເລເຊຍ, ມຸງມ້າ, ໄທ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຢູ່ທະວີບອາຟຼິກກາ.



ຕົ້ນ ຜັກສະເມັກ ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ ຫຼາຍປະເທດຄື: ປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳບູເຈຍ, ໄທ ແລະ ມຽນມາ.

ຕົ້ນ ຜັກສະເມັກ [Ton Phak Sa Mek]
ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Syzygium gratum*, **ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ:** *Eugenia*

ຂ້ອຍແມ່ນ ຕົ້ນຜັກສະເມັກ, ເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍປີ. ລຳຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງງາ ມີສີນ້ຳຕານແດງ; ລຳຕົ້ນແກ່ ມີເກັດບາງໆ ຂະໜາດນ້ອຍ ສີນ້ຳຕານແດງ ຊ້ອນກັນເປັນຫຼາຍໆຊັ້ນ, ເກັດນັ້ນ ຫຼຸດລົ້ນ ອອກງ່າຍ ແລະ ແລ້ວເປືອກຂອງລຳຕົ້ນກໍ່ ກຽງມື້ນ. ໃບອ່ອນຈະເປັນສີເທົາແກມແດງ, ມີລົດຝາດ ແລະ ຢູ່ຕາມແຜ່ນໃບ ມີຈຸດ ນ້ຳມັນລະເທີຍຢາຍຢູ່ທົ່ວໆ. ຂ້ອຍມີການກະຈາຍພັນຢູ່ ຫຼາຍປະເທດຄື: ປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳບູເຈຍ, ໄທ ແລະ ມຽນມາ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຂ້ອຍມັກເກີດແມ່ນ ໃນປ່າດົງດິບ, ເກີດຢູ່ຕາມແຄມໜອງ ແຄມຫ້ວຍ ຫຼື ເກີດຢູ່ຕາມປ່າເຫຼົ້າ ແລະ ໄຮ່ເກົ່າ. ລຳຕົ້ນຂອງຂ້ອຍສູງ 4-7 ມ, ເສັ້ນຜ່າກາງ 10-15 ຊມ. ໃບ ແມ່ນໃບດຽວ ຈັບພາບກັນ, ໃບ ມີຮູບຫອກ, ແຜ່ນໃບໜຽວ, ຜິວໃບມັນ, ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບແຫຼມຍາວ, ໂຄນໃບ ເປັນຮູບຫຼີ້ມ. ຂະໜາດໃບຍາວ 5.2-8 ຊມ, ກ້ວາງ 1.5-3 ຊມ. ດອກອອກເປັນຊໍ່ອອກ ຢູ່ຕາມປາຍກິ່ງ, ດອກສີຂາວນວນ. ໝາກ ກົມມົນ ສີຂາວ, ມີເນື້ອ ແລະ ມີແກ່ນດຽວ. ດອກ ອອກໃນ ເດືອນມີນາ ເຖິງເດືອນເມສາ. ໝາກອອກໃນເດືອນມິຖຸນາ, ແກ່ໃນ ເດືອນກໍລະກົດເຖິງເດືອນສິງຫາ. ການບໍລິໂພກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕົ້ນ ສະເມັກມີມາແຕ່ໂບຮານ ນະການ ໂດຍສະເພາະໃບອ່ອນ ແລະ ຍອດອ່ອນໃຊ້ກິນກັບລາບ, ກັບເອາະ, ກັບ ເຂົ້າປຸ້ນຫຼື ຈ້ຳແຈ້ວ, ໝາກສູກ ມີຮີດຝາດຫວານກິນໄດ້. ນອກນັ້ນ ຮາກ ແລະເປືອກຂອງລຳ ຕົ້ນຍັງໃຊ້ຕົ້ມກິນເປັນຢາບຳລຸງຕັບ.



ຮູບ 1: ຮູບດອກ ແລະ ໝາກ
 ຮູບ 2: ຮູບໃບ



ຮູບ 1: ຮູບລຳຕົ້ນຕາວໂດຍລວມ

ຕົ້ນ ໝາກຕາວ [Ton Mak Tao]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Arenga westerhoutii*

ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: Sugar palm tree

ຂ້ອຍແມ່ນຕົ້ນໝາກຕາວ ເປັນພືດໃບລ້ຽງດຽວຈັດຢູ່ໃນພືດຕະກູນດຽວກັນກັບຫວາຍ, ຕົ້ນຕານ ຕົ້ນພ້າວ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ຂ້ອຍມີການກະຈາຍພັນຢູ່ທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ມຸ່ງມ້າ, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ. ສຳລັບຢູ່ປະເທດລາວ ຂ້ອຍກະຈາຍພັນຢູ່ແຕ່ໃນເຂດພາກເໜືອເທົ່ານັ້ນ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຂ້ອຍມັກ ແມ່ນປ່າດົງດິບຊຸ່ມ ແລະ ເຢັນພໍສົມຄວນ. ຂ້ອຍມີຄວາມສູງ 8-20 ແມັດ ເປັນລຳຕົ້ນ ດຽວບໍ່ແຕກກິ່ງກ້າ, ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 25-60 ຊມ. ໃບ ແມ່ນໃບປະສົມແບບຂົນນົກ, ຈັດ ຮຽງກັນ ແບບວຽນສະຫຼັບ ແຜ່ນໃບມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຍາວ 7-8 ແມັດ ກວ້າງ 3-4 ແມັດ, ໃບຍ່ອຍ ຍາວ 1,6-1,8 ແມັດ ກວ້າງ 7-8 ຊມ. ດອກ ອອກເປັນຊໍ່ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເອີ້ນ ວ່າ: ແຊງ ຍາວປະມານ 1-2 ແມັດ, ມີກາບ ທັງແຊງ ທັງຫຍາບ ຊຶ່ງແມ່ນໃບຊ້ອນຊໍ່ ດອກຫຸ້ມຫໍ່ຊໍ່ດອກໄວ້. ດອກຍ່ອຍເປັນດອກເພດແຍກ ດອກເພດແມ່ ເລີ່ມບານກ່ອນ ດອກເພດຜູ້ ຊຶ່ງຢູ່ລະຫວ່າງ ເດືອນຕຸລາ ເຖິງເດືອນພະຈິກ. ໝາກ ອອກໃນເດືອນ ພະຈິກເຖິງເດືອນມັງກອນ, ໝາກສຸກໃນເດືອນມັງກອນເຖິງເດືອນມີນາ ຊຶ່ງເປັນໄລຍະ ທີ່ປະຊາຊົນອອກເກັບກູ້. ໝາກຕາວ ຈັບເປັນແຊງໃຫຍ່, ແຊງໜຶ່ງມີໝາກປະມານ 3500 ໜ່ວຍ. ແມ່ນໝາກມີເນື້ອ, ຮູບກົມ, ໃນໝາກໜຶ່ງມີ ແກ່ນ 2-5 ແກ່ນ, ມີແພຫຼໍ່ ລ້ຽງເປັນສີຂາວໃສ ແກມສີເທສີອງອ່ອນ, ມີນ້ຳ ໜຽວແລະຄັນມີ ເວລາເຮົາຈັບບາຍ ໂດຍກົງ. ຂ້ອຍມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຍອດຂອງລຳຕົ້ນ ມີລົດຫວານ ໃຊ້ປຸງແຕ່ງ ອາຫານ ເຊັ່ນ: ແກງກະທິ, ແກງເຜັດ ຫຼື ແກງຈິດ; ສ່ວນວ່າໃບ ເພິ່ນໃຊ້ເຮັດໝວກ, ໃຊ້ ມຸງເຮືອນ ຫຼື ມຸງຄອກສັດຕ່າງໆ ມີຄວາມທົນທານໄດ້ຫຼາຍໆປີ. ພິເສດອີກອັນໜຶ່ງ ພວກ ເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ກິນນ້ຳຫວານ, ນ້ຳໝາກຕາວ ຫຼືນ້ຳໝາກໄມ້ປັ້ນ ອາດ ຈະໄດ້ສັງເກດ ເຫັນເມັດສີຂາວ ຂະໜາດເທົ່າກັບຫົວໂປ້ມີ ລອຍຢູ່ໃນຈອກ ອັນນັ້ນລະ ແມ່ນແພຫຼໍ່ລ້ຽງ ທີ່ໄດ້ເວົ້າມາຂ້າງເທິງ ຊຶ່ງໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຜະຫຼິດມາແລ້ວ, ມັນມີຄວາມນຸ້ມໜຽວ ແລະ ມີລົດຫວານ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມນິຍົມຂ້ອຍບໍ່ປ່ຽນແປງ ມາແຕ່ຊ້ານານ. ພິເສດອັນ ທີ່ສອງ ແມ່ນປະຊາຊົນຍັງຕັດຍອດຊໍ່ດອກເພດຜູ້ ຊຶ່ງຊາວບ້ານເອີ້ນທົ່ວໄປ ວ່າ “ໂຄຍ ຕາວ” ແລ້ວໂຕ່ງເອົານ້ຳທີ່ໄຫຼອອກມາ. ນ້ຳ ມີລົດຫວານຫອມ, ເມື່ອເພິ່ນຕື້ມຂຽວແລ້ວ ເຮັດເປັນນ້ຳຕານກ້ອນໄດ້ ແບບດຽວກັບນ້ຳຕານກ້ອນທີ່ໄດ້ຈາກຕົ້ນຕານນັ້ນເອງ.



ຮູບ 2: ຮູບແຊງໝາກ

ຮູບ 3: ຮູບໝາກຕັດທາງຂວາງ

ຮູບ 4: ຮູບແພງຫຼັງຫຸ້ມແກ່ນ

ຕົ້ນ ໝາກຕາວ ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ ຫຼາຍປະເທດຄື: ມຽນມາ, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ.


ຕົ້ນ ຜັກຫວານ [Ton Phak Wan]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Melientha suavis*, ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: *melientha*

ຂ້ອຍແມ່ນຕົ້ນຜັກຫວານ, ເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນ ມີອາຍຸຫຼາຍປີ, ຄົນລາວ ແລະ ຄົນອີ່ສານຢູ່ປະເທດໄທ ຮູ້ຈັກຂ້ອຍດີ ອາດແມ່ນຍ້ອນລົດຊາດຂອງຂ້ອຍ ຫວານ ແລະ ແຊບຊ້ອຍ ເມື່ອປຸງແຕ່ງໃນອາຫານຕາມສູດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃນລາວ. ຈຸດພິເສດຂອງຂ້ອຍແມ່ນປົ່ງຍອດອ່ອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນເວລາທີ່ອາກາດອົບເອົາ ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ແມ່ນຍາມນັ້ນລະທີ່ຂ້ອຍມີລົດຊາດແຊບ ແລະ ຫອມ ກວ່າຍາມໃດໆເລີຍ. ຂ້ອຍມີການກະຈາຍພັນຢູ່ປະເທດ ລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ປະເທດຟິລິບປິນ. ຂ້ອຍເກີດ ຢູ່ຕາມປ່າປ່ຽນໃບ ແລະ ປ່າປະສົມ. ຂ້ອຍເປັນຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ, ສູງ 10-15 ແມັດ. ໃບ ແມ່ນໃບດຽວ, ຈັບສະຫຼັບກ້ຽວວຽນ, ຂອບໃບລຽບ ແລະ ເວລາເປັນໃບອ່ອນແຜ່ນໃບຂອງຂ້ອຍກອບຕິ່ງເຕັມຕະຫຼອດເວລາ. ດອກອອກເປັນຊໍ່ ອອກຕາມຫຼົບໃບ ແລະ ຫ້ອຍຈັບຕາມລຳຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງງາ. ມີຊໍ່ດອກຜູ້ ແລະ ຊໍ່ດອກແມ່ ຕ່າງກັນຢູ່ພາຍໃນຕົ້ນດຽວ. ເມື່ອເປັນໝາກ ສ່ວນຫຼາຍ ໝາກຈັບເປັນພົ້ວແໜ້ນໜາຕາມລຳຕົ້ນ ຫຼື ກິ່ງງາ ຊຶ່ງມັນໄດ້ວິວັດມາຈາກດອກແມ່ນັ້ນເອງ. ໝາກເປັນຮູບໄຂ່ ມີແກ່ນດຽວ. ລະດູອອກດອກ ແລະ ໝາກ ປະກົດໄລ່ເລ້ຍກັນ ແລະ ເລີ້ມແຕ່ ເດືອນທັນວາ ໄປຈົນເຖິງເດືອນມີນາ. ຕົ້ນຜັກຫວານ ເປັນພືດທີ່ຊາວບ້ານນິຍົມນຳມາເປັນອາຫານແຕ່ສະໄໝຢູ່ຢ່າງເປັນຕົ້ນມາ ຍ້ອນເປັນຜັກປ່າເລີດລົດ ຊະນິດໜຶ່ງ ຈົນຜູ້ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ປູກຕົ້ນນີ້ໄວ້ແຄມສວນແຄມນາ ເພື່ອສະດວກເກັບກິນຍອດອ່ອນ ແລະ ຊໍ່ດອກພ້ອມ. ອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງຈາກຜັກຫວານກໍ່ມີ ແກງໃສ່ປາ ປະສົມໄຂ່ມົດຍິ່ງດີເລີດ, ຂົ້ວໃສ່ໄຂ່, ເຮັດຊຸບ ແລະ ໜຶ່ງກັບແຈ່ວ ຫຼື ປິ່ນປາ. ນອກຈາກໃຊ້ເປັນຜັກແລ້ວ ເພິ່ນຍັງໃຊ້ຮາກຂອງຕົ້ນຜັກຫວານເປັນຢາແກ້ໄຂ້ຮ້ອນນຳອີກ.



ຮູບ 1: ຮູບຍອດອ່ອນ ແລະ ໃບ
 ຮູບ 2: ຮູບຊໍ່ດອກຜູ້
 ຮູບ 3: ຮູບໝາກອ່ອນ ແລະ ໝາກສຸກ



ຕົ້ນຜັກຫວານ ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ປະເທດ ລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຟິລິບປິນ



ຕົ້ນໄຜ່ ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ທຸກປະເທດໃນທະວີບເອເຊຍ

ຕົ້ນໄຜ່ [Ton Phai]
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Bambusa spp., ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: Bamboo

ຂ້ອຍຄືຕົ້ນໄຜ່ ເປັນພືດຫຍ້າ ມີອາຍຸຫຼາຍປີ, ຢູ່ໃນຕະກຸນດຽວກັບກັບພວກຫຍ້າຂວາກ, ຕົ້ນສາລີ, ຕົ້ນອ້ອຍ ແລະ ຕົ້ນເຂົ້າ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ຕົ້ນໄຜ່ທີ່ພົບຢູ່ລາວທັງໝົດ ມີຫຼາຍກວ່າ 50 ຊະນິດ ເຊັ່ນ: ໄມ້ຊອດ, ໄມ້ເຮັຍ, ໄມ້ຫົກ, ໄມ້ສ້າງໄພ, ໄມ້ເພັກ, ໜໍ່ຂົມ, ໜໍ່ລ້ຽນ, ໄມ້ໄລ່, ໄມ້ບົງ, ... ພວກຂ້ອຍ ມີການກະຈາຍພັນໃນເກືອບທຸກປະເທດໃນທະວີບເອເຊຍ ແລະ ເປັນພືດເຂດຮ້ອນສະເພາະ. ຂ້ອຍມັກເກີດຢູ່ຕາມປ່າປະສົມ, ປ່າດິບ ແລ້ງ. ຂ້ອຍເກີດເປັນສຸມ ມີລຳເຫງົ້າຢູ່ໃຕ້ດິນ, ແລະ ລຳທີ່ພວກເຮົາເຫັນຕາມສຸມໄຜ່ນັ້ນ ແມ່ນລຳຕັ້ງ ເກີດເທິງໜ້າດິນນັ້ນເອງ. ລຳປະເພດນີ້ ເອີ້ນວ່າ: ລຳຕົ້ນ ຊຶ່ງມີຂໍ້, ປ້ອງ, ໃບ ແລະ ມີແໜງ. ໃນຊ່ວງຊີວິດໜຶ່ງຂອງຂ້ອຍ ຈະອອກດອກ ແລະ ໝາກ ເທື່ອດຽວ ແລ້ວຕາຍໄປ. ຂ້ອຍເປັນພືດທີ່ມີຄວາມຜູກພັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນລາວມາແຕ່ບູຮານນະການ ເນື່ອງ ຈາກວ່າເປັນພືດທີ່ຫງ່າງາມ ມີລ້ອມຕົວ, ເຕີບໃຫຍ່ໄວ, ລຳແກ່ ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບດິນພ້ອມທັງອາກາດໄດ້ດີ. ສະນັ້ນ, ຄົນລາວບູຮານຈຶ່ງນຳໃຊ້ຂ້ອຍນັບແຕ່ ໜໍ່, ກາບ, ລຳ ແລະ ໃບ ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ: ລຳຕົ້ນ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງໃຊ້ຫາບ ໃຊ້ຫາມ, ໃຊ້ເປັນສິ່ງປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່: ກະບຸງ, ກະຕ່າ, ຫວດເຂົ້າ, ຕິບເຂົ້າ, ພາເຂົ້າ, ເຮັດໄມ້ທູ່, ໄມ້ຈຶ້ມແຂ້ວ, ໄມ້ສຽບເອັນ, ກະເປົາ, ໂຕະຕັ້ງ, ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ເຄື່ອງຫາປາ, ເຄື່ອງດົນຕີ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນພິທີກຳທາງສາດສະໜາຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ພິທີຕິບພະຊາຍ, ຮ້ອຍດອກໄມ້, ຄັນທຸງ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນກາບ ນຳມາເຮັດກຸບໃຊ້ປັ່ງແດດ ປັ່ງຝົນໄດ້ດີ. ນອກ ນັ້ນ, ຍັງເອົາໝໍ້ ມາປຸງແຕ່ງອາຫານປະເພດຕ່າງໆ ຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ແກງ, ຊຸບ, ໝັກ, ຕົ້ມ, ແຈ່ວ ຫຼື ຮັກສາໄວ້ກິນດິນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ໄດ້ອີກ ດັ່ງ: ໝໍ້ໄມ້ສົ້ມ, ໝໍ້ໄມ້ແຊ ແລະ ໝໍ້ໄມ້ແຫ້ງ.



ຮູບ 1: ຮູບຕົ້ນໄຜ່ໂດຍລວມ
ຮູບ 2: ຮູບລຳ ແລະ ໜໍ່ໄມ້



ຮູບ 1: ຮູບໝາກ
ຮູບ 2: ຮູບໃບ

ຕົ້ນໝາກກອກ ມີຖິ່ນກຳເນີດໃນປະເທດ ມາເລເຊຍ, ພົບຢູ່ ປະເທດ ມຽນມາ, ກຳບູເຈຍ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເຊັ່ນດຽວ.

ຕົ້ນ ໝາກກອກ [Ton Mak Kok]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Spondias pinnata*

ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: hog plum, wild mango, malayan mombin

ຂ້ອຍແມ່ນຕົ້ນໝາກກອກ ເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນຊະນິດໜຶ່ງໃນຕະກູນດຽວກັນກັບພວກໝາກມ່ວງ, ໝາກກອກນ້ຳ, ໝາກມ່ວງທີມະພານ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ຕົ້ນໝາກກອກ ມີໃບລື່ນຕາມລະດູການ, ທຸກພາກສ່ວນມີນ້ຳຢາງ ສີຂາວໄສ, ເມື່ອຖືກບາດແຜ ນ້ຳຢາງຈະໄຫຼອອກມາແລ້ວປ່ຽນເປັນສີດຳທັນທີ. ລັກສະນະໜຶ່ງຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນທຸກພາກສ່ວນຂອງຂ້ອຍໂດຍສະເພາະຍອດອ່ອນມີກິ່ນຂົວ ອາດແມ່ນຍ້ອນມີນ້ຳຢາງຫຼາຍ. ຂ້ອຍມີການກະຈາຍພັນຢູ່ປະເທດ ມຽນມາ, ກຳບູເຈຍ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ. ຂ້ອຍມັກເກີດໃນແວດລ້ອມ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ແລະ ພົບໃນປ່າ ບໍ່ຈຳກັດປະເພດ. ຂ້ອຍມີລຳຕົ້ນ ສູງເຖິງ 20 ແມັດ ເປືອກມີສີຂີ້ເຖົ້າຈິດໆ, ໃບ ແມ່ນໃບປະສົມແບບຂົນນົກປາຍຄືກ, ໂຄນ ຂອງໃບຍ່ອຍບໍ່ສະເໝີກັນ. ດອກ ອອກເປັນຊໍ່, ອອກຢູ່ທາງຂ້າງ, ດອກ ມີສີຂາວຫາ ສີຄືມ ຫຼື ສີຂາວອອກຊຽວ. ໝາກ ແມ່ນໝາກມີເນື້ອ, ໝາກຮູບໄຂ່ ມີແກ່ນໃຫຍ່ໜຶ່ງຫນ່ວຍ ແລະ ແຂງເອີ້ນວ່າແກ່ນ. ດອກ ອອກໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ເຖິງເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ໝາກ ອອກໃນເດືອນກໍລະກົດ ເຖິງ ເດືອນທັນວາ. ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ໄມ້ໝາກກອກ ເຮັດເພີນີເຈີຕິບແຕ່ງພາຍໃນເຮືອນ. ເປືອກ ຂອງລຳຕົ້ນໃຊ້ປົວອາການເຈັບກະເພາະອາຫານ, ແກ້ອາການທ້ອງບິດ, ປົວອາການປະດິງ. ດອກ, ໝາກ ແລະ ໃບອ່ອນນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານເຊັ່ນ: ຕົ້ມສົ້ມປາ, ໃບອ່ອນກິນກັບລາບ. ສ່ວນໝາກສຸກນຳມາຕຳແຈ້ວ ແລະ ຕຳໃສ່ໝາກທຸ່ງ. ໝາກ ແລະ ໃບອ່ອນໄດ້ກາຍ ເປັນເຄື່ອງປະກອບໃນອາຫານຂອງຊາວລາວມາແຕ່ໃດໆມາ ໂດຍຊາວບ້ານເກັບເອົາໝາກ ແລະ ໃບໃນທຳມະຊາດມາຂາຍເປັນສິນຄ້າ. ປັດຈຸບັນກໍໄດ້ມີການປູກພັນໄມ້ຊະນິດນີ້ຢູ່ ແຕ່ກໍຍັງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ໃຊ້ໝາກ ແລະ ໃບ ອ່ອນຫຼາຍກວ່າການນຳໃຊ້ ຊື້ນສ່ວນອື່ນ.





ເຫັດ [Hed]
ຊື່ທົ່ວໄປເປັນພາສາ ອັງກິດ: Mushroom

ຄວາມຈິງແລ້ວ ເຫັດທີ່ບໍລິໂພກຢູ່ບ້ານເຮົາໃນນາມເຫັດເກັບຈາກທຳມະຊາດ ນອນໃນ ຫຼາຍຕະກູນ, ມັນຈະເກີດໃນຊ່ວງທີ່ມີອາກາດອົບເອົ້າທີ່ສຸດ ກ່ອນລະດູຝົນ ແລະ ມີບາງ ຊະນິດກໍມັກເກີດກາງລະດູຝົນໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຊຸມຊື່ມເໝາະສົມ. ໃນຈຳນວນ ເຫັດທີ່ບໍລິໂພກກັນຢູ່ ມີຈຳນວນໜຶ່ງເກີດຢູ່ດິນ ໂດຍບຸດິນຂຶ້ນມາ, ບາງຄັ້ງກໍຊ້ອນຢູ່ ກ້ອງໃບໄມ້ແຫ້ງ ແລະ ມີຈຳນວນໜຶ່ງພັດເກີດນຳແຕ່ທອນໄມ້ໂດກ. ຕົນໂຕຂອງຂ້ອຍ ຕ່າງຈາກພືດ, ບາງເທື່ອເພິ່ນກໍຈັດຂ້ອຍເຂົ້ານຳພືດ ບາງເທື່ອເພິ່ນກໍຈັດຂ້ອຍໄວ້ຕ່າງ ຫາກ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພືດ ຍ້ອນຂ້ອຍຕ່າງຈາກໝູ່ ເພາະຂ້ອຍບໍ່ສາມາດສັງເຄາະແສງໄດ້ ມີແຕ່ຖ້າຮັບອາຫານທີ່ສ້າງມາແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ຂ້ອຍແຜ່ພັນໄດ້ດ້ວຍສະບໍ. ເຫັດ ມີຈຳ ນວນຫຼາຍແສນຊະນິດ ມີທັງເຫັດທີ່ກິນໄດ້ ແລະ ເຫັດທີ່ກິນບໍ່ໄດ້ ຫຼືເອີ້ນວ່າເຫັດເບື້ອ. ຂ້ອຍມີການກະຈາຍພັນຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຊະນິດຂອງເຫັດ. ເຫັດໂດຍ ທົ່ວໄປ ມີການປະກອບສ້າງຄ້າຍຄືກັນເຊັ່ນ: ໝວດເຫັດ ແລະ ພື້ນໝວກ ຊຶ່ງບັນຈຸກີບ ຫຼາຍໆ ຫຼື ພື້ນໝວກເປັນຮູໆ ຫຼື ແບບອື່ນອີກ, ວົງແຫວນ, ກ້ານ, ເປືອກຫຸ້ມສຳລັບບາງ ຊະນິດ ແລະ ເສັ້ນໄຍ. ເຫັດມີວົງຈອນຊີວິດຄືກັນກັບພືດຂຶ້ນຕ່ຳ ຊຶ່ງເກີດຈາກເມັດສະບໍ ທີ່ຖືກຜລິດຢູ່ພື້ນໝວກ ເວລາທີ່ດອກເຫັດແກ່ແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ຈາກນັ້ນ ມັນຈຶ່ງຕົກລົ່ນລົງ, ເມື່ອພົບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ: ຄວາມຊຸມ ແລະ ອຸນຫະພູມ ເມັດສະບໍ ກໍຈະງອກອອກມາເປັນເສັ້ນໄຍ, ຈາກນັ້ນເສັ້ນໄຍຈຳນວນໜຶ່ງຈຶ່ງໃຫ້ກຳເນີດແກ່ດອກ ເຫັດ ຊຶ່ງຈະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກາຍເປັນດອກທີ່ສົມບູນ. ປະຊາ ຊົນນຳໃຊ້ດອກເຫັດມາແຕ່ສະໄໝບູຮານນະການ ໂດຍໃຊ້ປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນຢາ. ເຫັດທີ່ນິຍົມນຳມາເປັນອາຫານ ແລະ ມີລາຄາແພງ ໄດ້ແກ່: ເຫັດປວກ, ເຫັດແປກ, ເຫັດເຜາະ, ເຫັດລະໂງກ, ເຫັດຂອນຂາວ, ເຫັດບົດ, ເຫັດເຜິ້ງ ແລະ ຊະນິດອື່ນໆ. ຍ້ອນມີຄືນນິຍົມກິນຫຼາຍ ແລະ ຍ້ອນເຫັດມີລາຄາແພງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄືນ ມີຫົວຄິດນຳເອົາເຫັດມາປູກ ສາມາດເກັບມາກິນ ແລະ ເກັບມາຂາຍເພື່ອສ້າງລາຍ ໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ທຸກໆລະດູ, ມີຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ເຫັດບົດ, ເຫັດຂອນຂາວ, ເຫັດນາງລົມ ແລະ ເຫັດເຟືອງ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງນຳມາເປັນຢາ ເຊັ່ນ: ເຫັດແປກ, ເຫັດຊື້ນ ດັ່ງເຫັດລື້ນຈີ້ ແລະ ເຫັດໄມ້, ເພິ່ນເອົາດອກເຫຼົ່າກິນເປັນຢາ ລ້າງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ບຳລຸງເລືອດ ແລະ ບຳລຸງປະສາດ.

ຮູບ 1: ຮູບດອກເຫັດທີ່ເກີດຢູ່ດິນ (ກິນໄດ້)



ຮູບ 2: ຮູບດອກເຫັດທີ່ເກີດຢູ່ດິນ (ກິນໄດ້)



ຮູບ 3: ຮູບດອກເຫັດທີ່ເກີດຢູ່ດິນ ທີ່ກິນບໍ່ໄດ້ (ເປື້ອ)

ຮູບ 4: ຮູບເຫັດທີ່ເກີດຕາມຂອນໄມ້ (ເປື້ອ)



ເຄືອ ຢານາງ [Kheua Ya Nang]
ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Tiliacora triandra*



ຮູບ 1: ຮູບໃບ ແລະໝາກ
ຮູບ 2: ຮູບນ້ຳຄື້ນຈາກໃບຢານາງ
ຮູບ 3: ຮູບໃບ

ເຄືອຢານາງ ກະຈາຍພັນຢູ່ທຸກປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາວັນອອກສຽງໃຕ້

ຂ້ອຍແມ່ນເຄືອຢານາງ ຊຶ່ງເປັນພືດທີ່ນ້ອນໃນຕະກຸນດຽວກັນກັບ ເຄືອ ໝ້ນ້ອຍ, ເຄືອ ເຂົາຮໍ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ຂ້ອຍຕິດພັນກັບ ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນລາວມາແຕ່ຊ້ານານ. ລຳຕົ້ນ ເປັນເຄືອກົມ ສີຂຽວຊ້ຳ, ຂະໜາດນ້ອຍ, ໝັ້ນໜຽວ ແລະ ທົນທານ, ກ້ຽວພັນຕາມຕົ້ນ ໄມ້ອື່ນຢ່າງສົນລະວົນຢູ່. ຂ້ອຍກະຈາຍພັນຢູ່ທຸກປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາວັນອອກສຽງໃຕ້. ຂ້ອຍມັກ ເກີດຢູ່ຕາມປ່າດົງດິບ, ປ່າປ່ຽນໃບ, ປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າປະສົມ. ໃບຢານາງ ເປັນໃບດຽວ ອອກສີຂຽວ, ຈັບສະຫຼັບກັນ, ມີຮູບໄຂ່, ປາຍໃບແຫຼມ, ຂອບໃບລຽບ. ດອກອອກເປັນຊໍ່ຢູ່ຕາມເຄືອ ຫຼື ຫຼົບກ້ານໃບ. ແມ່ນດອກແຍກເພດ ຢູ່ຕ່າງຕົ້ນ, ບໍ່ມີກົບດອກ. ໝາກ ເປັນຮູບກົມຂະໜາດນ້ອຍ ປະມານຂະໜາດຂອງ ໝາກແຄ້ງຂົມ, ໝາກອ່ອນ ມີສີຂຽວ ເວລາສຸກເປັນສີແດງຊ້ຳ. ດອກ ແລະ ໝາກ ອອກລະຫວ່າງເດືອນເມສາ. ນ້ຳ ຄື້ນຈາກໃບຢານາງມີສີຂຽວເຂັ້ມຍ້ອນມີທາດ ສານກໍລໍຟິນ (Chlorophyll) ຊຶ່ງຊາວລາວຮູ້ນຳໃຊ້ມາແຕ່ສະໄໝບູຮານໂດຍນຳ ມາແກງໃສ່ໝໍ້ໄມ້, ແກງໃສ່ໝໍ້ຫວາຍ ແລະ ຄື້ນປະສົມກັບໃບໝ້ນ້ອຍ ອັນເຮັດໃຫ້ ອາຫານເຢື່ອງນັ້ນມີລົດຫວານອ່ອນໆ ທີ່ເປັນເອກກະລັກ. ນອກນັ້ນ ເພິ່ນຍັງໃຊ້ຕົ້ນ ຢານາງເປັນຢາປົວພະຍາດຫຼາຍຢ່າງອີກ ດັ່ງ ຮາກຢານາງ ນຳມາຕົ້ມແກ້ໄຂ້ຮ້ອນ, ປົວໄຂ້ມາລາເລຍ. ເຄືອຢານາງໃຊ້ເປັນຢາເຢັນ ປົວອາການຕານເຕັ້ນຕາມຕົນໂຕ. ນ້ຳຄື້ນຈາກໃບຢານາງ ໃຊ້ເປັນຢາແຜນບູຮານທີ່ມະຫັດສະຈັນ(ຈາກການວິໄຈຂອງນັກ ວິຊາການສາທະລະນະສຸກປະເທດໄທ, 2008) ເພາະສາມາດປົວພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍການດື່ມນ້ຳຢານາງວັນໜຶ່ງ 3 ເທື່ອກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາໜຶ່ງ ເດືອນເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບປ່ວຍເນື່ອງຈາກພະຍາດຫຼາຍຢ່າງເບົາບາງລົງ, ພະຍາດທີ່ ກ້ຽວຂ້ອງ ແມ່ນ ມະເຮັງປອດ, ມະເຮັງຕັບ, ມະເຮັງມົດລູກ, ເນື້ອງອກໃນມົດລູກ, ເບົາ ຫວານແລະຄວາມດັນເລືອດສູງ, ຂັບສານພິດໃນເລືອດ, ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ໂລກພູມແພ້ ແລະ ປວດຕາມຮາງກາຍ. ຍັງມີການນຳໃຊ້ຢານາງໃນດ້ານ ເຄື່ອງສຳອາງອີກ ມີການເຊື່ອ ວ່ານ້ຳຄື້ນຈາກໃບຢານາງທາ ຕາມໜັງຫົວເປັນປະຈຳຈະ ເຮັດໃຫ້ຜົມປິ່ງ ແລະ ອ່ອນນຸ້ມ ຊຶ່ງຄວາມສວຍງາມອີກດ້ວຍ.





ຮູບ 1: ຮູບເຄືອອ່ອນ ແລະ ໃບ
ຮູບ 2: ຮູບເຄືອແກ່

ສະຄ່ານ ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ບາງປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ເຊັ່ນ: ຢູ່ປະເທດລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ມຽນມາ

ເຄືອສະຄ່ານ [Kheua Sa Khan]

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Piper ribesioides*

ຊື່ທົ່ວໄປ ເປັນພາສາ ອັງກິດ: Pepper wood, Chili wood

ຂ້ອຍມີຊື່ວ່າ ສະຄ່ານຊຶ່ງເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຮູບຮ່າງ ລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບເຄືອພູ
ແລະ ພິກໄທ ມີປ່ອງອາກາດດູນຂຶ້ນ ແລະ ແຈກຢາຍສຸດລວງຍາວຂອງເຄືອ ພ້ອມຍັງ
ມີຮາກປົ່ງອອກຕາມຂໍ້ ເພື່ອຈັບເກາະກາຍໄປຕາມຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ສິ່ງອື່ນໆ. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້
ຍາດກິນນ້ຳ ຫຼື ອາຫານຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຂ້ອຍອາໄສຢູ່ແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ຂ້ອຍພຽງອາໄສ
ຈັບຫ້ອຍໃສ່ເທົ່ານັ້ນສົມກັບທີ່ ເພິ່ນເອີ້ນຂ້ອຍວ່າເປັນພືດອົງອາໄສ. ສະເພາະຢູ່ປະເທດ
ລາວ ແມ່ນພົບຢູ່ພາກເໜືອເທົ່ານັ້ນ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຂ້ອຍມັກທີ່ສຸດ ແມ່ນປ່າດົງ
ດິບບ່ອນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ເຄືອຂອງຂ້ອຍ ຍາວ ປະມານ 4 ແມັດ ແລະ ກ້ວາງ
4-15 ຊັງຕີແມັດ, ໃບຂອງຂ້ອຍເປັນໃບດຸ່ງວ, ສີຂຽວ, ຜິວມັນ, ຮູບໄຂ່, ຈັບສະຫຼັບ.
ດອກ ມີສີຂາວ, ອອກເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຈັດລຽນ ເປັນຊໍ່ ຮູບກົມຍາວ ອອກຢູ່ຕາມຂໍ້.
ມີ ດອກເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ແຍກກັນ. ຂ້ອຍອອກດອກໃນເດືອນ ພຶດສະພາຫາເດືອນ
ມິຖຸນາ. ໝາກເປັນຮູບກົມ, ຂະໜາດນ້ອຍ, ຈັບລຽນກັນໜ້າແໜ້ນຄ້າຍຄື ໝາກພິກໄທ,
ອອກໃນເດືອນ ກໍລະກົດເຖິງເດືອນກັນຍາ, ເວລາແກ່ ໝາກມີສີແດງ. ຄວາມພິເສດ
ອັນໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕ່າງຈາກໝູ່ ເພື່ອນທັງຫຼາຍ ແມ່ນທຸກພາກສ່ວນຂອງຂ້ອຍ ມີ
ກິ່ນຫອມ ແລະ ມີລົດເຜັດ. ຜູ້ຄົນນິຍົມເອົາເຄືອຂອງຂ້ອຍໄປປຸງແຕ່ງອາຫານຍ້ອນ
ຄວາມພິເສດອັນນີ້ລະໂດຍສະເພາະເອາະຫຼາມ ຊຶ່ງເປັນອາຫານເອກກະລັກຂອງຊາວ
ຫຼວງພະບາງ. ຖ້າທ່ານເຄີຍໄປທ່ຽວເມືອງຫຼວງພະບາງ ທ່ານຈະຕ້ອງເຄີຍໄດ້ກິນເອາະ
ຫລາມໃສ່ສະຄ່ານຢ່າງແນ່ນອນ. ປະຊາຊົນພາກເໜືອສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມັກຕັດເອົາຂ້ອຍ
ມາກິນ ແລະ ຂາຍຢູ່ຕາມຕະຫຼາດ ຕະຫຼອດປີ, ເຄືອຂ້ອຍໃຫຍ່ເທົ່າໃດຂ້ອຍກໍຍິ່ງເຜັດ
ແລະ ຄົນກໍຍິ່ງມັກເທົ່ານັ້ນ. ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເປັນຫວັງຄື ຂ້ອຍຍ້ານແຕ່ຂ້ອຍຈະສູນພັນໃນຕໍ່
ໜ້າ ເພາະວ່າມີບາງຄົນຕັດເອົາແຕ່ພາກສ່ວນກົກຂອງຂ້ອຍໄປແລ້ວ ປະຖິ້ມພາກສ່ວນ
ປາຍໃຫ້ຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ຕາຍໄປຊື່ໆ. ເພື່ອເປັນການນຳໃຊ້ຂ້ອຍໃຫ້ຍາວນານ ເວລາ
ຕັດເອົາເຄືອຂອງຂ້ອຍນັ້ນ ຄວນຕັດເອົາສ່ວນປາຍຂ້ອຍແລ້ວປະພາກສ່ວນກົກໃຫ້
ຂ້ອຍໄດ້ແຕກໜ່ວຍ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍພັນຕໍ່ໄປ. ນອກຈາກ ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ຂ້ອຍ
ເປັນອາຫານແລ້ວເຂົາເຈົ້າຍັງໃຊ້ຂ້ອຍເປັນຢາແກ້ອາການຢື່ງທ້ອງ, ບຳລຸງເລືອດ ແລະ
ເປັນຢາຈະເລີນອາຫານອີກດ້ວຍ. ໃນເຂດພາກອີສານຂອງ ປະເທດໄທ ກໍມີການນຳ
ໃຊ້ຂ້ອຍເປັນຢາເຊັ່ນດຽວ ເຊັ່ນ ຢາປົວອາການຫອບຫິດ, ໃຊ້ໄລ່ລົມໃນກະເພາະ
ອາຫານ ແລະ ແກ້ ອາການ ຖອກທ້ອງ ອີກດ້ວຍ.



ລົງເລິກພາກປະຕິບັດ
ເຝິກຫັດຄົນລຸ້ນໃໝ່
ໃຫ້ມີພະລັງ
ໃນການອະນຸລັກ
ມັກໃນການປູກຕົ້ນໄມ້
ໃສ່ໃຈໃນການສຶກສາ
ຫ້າວຫັນໃນການພັດທະນາ
ພາຊາດຈະເລີນ

Pha Tad Ke Botanical Garden

ສວນພຶກສາຊາດ ຜາຕັດແກ້ ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ຫຼວງພະບາງ ເປັນສວນ
ພຶກສາຊາດແຫ່ງທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເຕົ້າໂຮມເອົາພັນພືດ
ທີ່ເກີດຢູ່ໃນທຸກໆພາກຂອງລາວ ຊຶ່ງຊຸມຊົນຊາວລາວ ເຄີຍນຳໃຊ້ ຫຼື ມີຄວາມ
ຮູ້ພັນມາແຕ່ຊານານ ມາປູກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງໄດ້ເຫັນ
ແລະ ສຶກສາ ຄຽງຂ້າງກັບການປູກພັນພືດທີ່ມາຈາກແຫ່ງອື່ນ ເພື່ອເປັນການສ້າງສິ່ງ
ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ອັນຈະເປັນສ່ວນປະກອບໃນການ
ສຶກສາ ພຶກສາຊາດຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຊີວະນານາພັນຂອງໂລກອີກດ້ວຍ.




Pha Tad Ke Botanical Garden
Luang Prabang, Lao PDR

ພິມທີ່: ບໍລິສັດ ເທບປັນຍາການພິມ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ຕາມເລກທະບຽນທີ່: 007 ພຈ 09012012

ຈຳນວນພິມ: 6,000 ຫົວ

Published with the generous support from SDC



Text: Khamfa Chanthavongsa

Drawings: Kongngern Sengdee

Drawings of the Orchids: Khamphat Thongchan

Graphic Design: Rik Gadella

© 2011, Pha Tad Ke Botanical Garden & the Authors

www.pha-tad-ke.com



ອັນວ່າເຄື່ອງປ່າຂອງດົງນັ້ນ
ມີມາກມາຍມະຫາສານ
ທີ່ປະຊາຊົນລາວຄູກຄູານ
ຊອກຫາເອົາມາໃຊ້
ຈົ່ງພາກັນອານລັກໄວ
ທຸກຊັ້ນສ່ວນຂອງມັນຍອມມີຄ່າ
ເພື່ອວ່າໃນບາດໜ້າ
ເຮົາຊິໄດ້ໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກມັນ
www.pha-tad-ke.com

ISBN 978-993240815-3



9 789932 408153